

資料

嶋野武、水野瑞夫、田中俊弘：岐阜薬科大学蔵葉目録（5）*

（植物分布地理研究）

福井県足羽郡美山町植物目録

Takeshi Shimano, Mizuo Mizuno, and Toshihiro Tanaka: List on the
Herbarium of Gifu College of Pharmacy (5)
List of the Plant's in MIYAMA-CHO, ASHIBA-GUN, Pref. FUKUI

Lycopodiaceae	<i>Lycopodium serratum</i> Thunb.	トウゲシバ
	<i>L. clavatum</i> L. var. <i>nipponicum</i> Nakai	ヒカゲノカヅラ
Equisetaceae	<i>Equisetum aruense</i> L.	スギナ
Botrychiaceae	<i>Botrychium ternatum</i> Swartz	フユノハナワラビ
	<i>Japanobotrydium strictum</i> Nishida	ナガホノナツノハナワラビ
Osmundaceae	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	ゼンマイ
Schzaeaceae	<i>Lygodium japonicum</i> Sw.	カニクサ
Hymenophyllaceae	<i>Mecodium wrightii</i> Copel	コケシノブ
	<i>Gonocormus minutus</i> w. d. B.	ウチワゴケ
Pteridaceae	<i>Dennstaedtia scabra</i> Moore	コバノイシカグマ
	<i>D. hirsuta</i> Mett.	イヌシダ
	<i>Microlepia marginata</i> C. Chr.	フモトシダ
	<i>Sphenomorphis chusna</i> Copel	ホラシノブ
	<i>Hypolepis punctata</i> Mett.	イワヒメワラビ
	<i>Pteridium aquilinum</i> Kuhn var. <i>latiusculum</i> Lind.	ワラビ
	<i>Pteris multifida</i> Poir.	イノモトソウ
	<i>P. inaequalis</i> Bak. var. <i>aequata</i> Tagawa	オオバノハチジョウシダ
	<i>Coniogramme japonica</i> Diels.	イワガネソウ
	<i>Onychium japonicum</i> Kunze	タチシノブ
	<i>Adiantum pedatum</i> L.	クジャクシダ
Plagiogyriaceae	<i>Plagiogyria euphlebia</i> Mett.	オオキジノオ
Aspidiaceae	<i>Matteuccia struthiopteris</i> Todaro	クサソテツ
	<i>M. orientalis</i> Trev.	イヌガンソク

* 嶋野 武、水野瑞夫：本紀要14.85～98(1964)

<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Max.	コウヤワラビ	
<i>Polystichum tripteron</i> Pr.	ジュウモンジシダ	
<i>P. retroso-paleaceum</i> Tagawa	サカゲイノデ	
<i>Cyrtomium fortunei</i> J. Sm.	ヤブソテツ	
<i>C. macrophyllum</i> Tagawa	ヒロハヤブソテツ	
<i>Polystichopsis standishii</i> Tagawa	リョウメンシダ	
<i>Dryopteris dickinsii</i> C. Chr.	オオクジャクシダ	
<i>D. uniformis</i> Makino	オクマワラビ	
<i>D. lacera</i> O. Ktze.	クマワラビ	
<i>D. pacifica</i> Tagawa	オオイタチシダ	
<i>D. sacrosancta</i> Koidz.	ヒメイタチシダ	
<i>D. erythrosora</i> O. Ktze	ベニシダ	
<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> Fée	ゲジケジシダ	
<i>Lastrea japonica</i> Copel	ハリガネワラビ	
<i>L. oligophlebia</i> Copel var. <i>elegans</i> Tagawa	ヒメワラビ	
<i>L. laxa</i> Copel	ヤワラシダ	
<i>Leptogramma mallissima</i> Ching.	ミヅシダ	
<i>Athyrium deltoidofrons</i> Makino	サトメシダ	
<i>A. vidalli</i> Nakai	ヤマイヌワラビ	
<i>A. wardii</i> Makino	ヒロハイヌワラビ	
<i>A. niponicum</i> Hance	イヌワラビ	
<i>A. otophorum</i> Koidz.	タニイヌワラビ	
<i>A. japonicum</i> Copel.	シケシダ	
<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> Nakai var. <i>pilosella</i> H. Ito	タカオシケシダ	
<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai	シロヤマシダ	
Blechnaceae	<i>Struthiopteris niponica</i> Nakai	シシガシラ
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i> L.	チャセンシダ
	<i>A. incisum</i> Thunb.	トラノオシダ
Polypodiaceae	<i>Lepisorus thunbergianus</i> Ching	ノキシノブ
Taxaceae	<i>Taxus cuspidata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>radicans</i> Nakai	チャボガヤ
Cephalotaxaceae	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> K. Koch var. <i>drupacea</i> Koidz.	イヌガヤ
Pinaceae	<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	アカマツ
Cryptomeriaceae	<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don.	スギ
Cupressaceae	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Sieb. et Zucc.	ヒノキ
Saururaceae	<i>Houtunia cordata</i> Thunb.	ドクダミ

Chloranthaceae	<i>Chloranthus serratus</i> Roemer et Schultes	フタリシズカ
Salicaceae	<i>Salix bakko</i> Kimura	バッコヤナギ
	<i>S. gracilistyla</i> Miquel	ネコヤナギ
Juglandaceae	<i>Juglans ailanthifolia</i> Carriere	オニグルミ
Betulaceae	<i>Alnus japonica</i> Steudel	ハンノキ
	<i>A. pendula</i> Matsum.	ヒメヤシャブシ
	<i>A. serrulatoides</i> Callier	カワラハンノキ
Corylaceae	<i>Corpinus japonica</i> Blume	クマシデ
	<i>C. heterophylla</i> Ficher	ツノハシバミ
Fagaceae	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.	クリ
	<i>Cyclobalanopsis onysinaefolia</i> Oerstedt	シラカシ
	<i>Quercus mongolica</i> Fischer var. <i>grosseserrata</i>	
	Rehder et Wilson	ミズナラ
	<i>Q. serrata</i> Thunb.	コナラ
Ulmaceae	<i>Celtis sinensis</i> Rersoon var. <i>japonica</i> Nakai	エノキ
	<i>Zelkowo serrata</i> Makino	ケヤキ
Moraceae	<i>Broussonetia kazinoki</i> Sieb.	コウゾ
	<i>Ficus nipponica</i> Fr. et Sav.	イタビカヅチ
	<i>Morus bombycis</i> Koidz.	ヤマグワ
Cannabinaceae	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.	カナムグラ
Urticaceae	<i>Boehmeria longispica</i> Steudel	ヤブマオ
	<i>B. nippononivea</i> Koidz.	カラムシ
	<i>B. tricuspis</i> Makino	アカソ
	<i>Debregeasia edulis</i> Weddell	ヤナギイチゴ
	<i>Elatostema involucratum</i> Fr. et Sav.	ウワバミソウ
Santalaceae	<i>Buckleya lanceolata</i> Miq.	ツクバネ
Polygonaceae	<i>Persicaria hydropiper</i> L.	ヤナギタデ
	<i>P. sagittata</i> H. Gross var. <i>aestiva</i> Masamune	ウナギツカミ
	<i>P. senticosa</i> Nakai	ママコノシリヌグイ
	<i>P. thunbergii</i> H. Gross	ミゾソバ
	<i>P. yokosaiana</i> Nakai	ハナタデ
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	ミチヤナギ
	<i>Reynoutria japonica</i> Houttuyn var. <i>uzenensis</i> Honda	ケイタドリ
	<i>Rumex japonicus</i> Houttuyn	ギシギシ
	<i>R. longifolius</i> A. P. de Candolle	ノダイオウ
	<i>Tovara filiformis</i> Nakai	ミズヒキ

Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	シロザ
Amaranthaceae	<i>Amaranthes japonica</i> Nakai	イノコヅチ
Phytolaccaceae	<i>Phytolacca americana</i> L.	ヨウシュヤマゴボウ
Caryophyllaceae	<i>Cerastium caespitosum</i> Gilbert var. <i>ianthes</i> Hara	ミミナグサ
	<i>Stellaria aquatica</i> Scopoli	ウシハコベ
	<i>S. paniculigera</i> Makino	オオヤマハコベ
Ranunculaceae	<i>Clematis apiifolia</i> A. P. de Candolle	ボタンヅル
	<i>C. japonica</i> Thunb.	ハンショウヅル
	<i>C. stans</i> Sieb. et Zucc.	クサボタン
	<i>C. terniflora</i> A. P. de Candolle var. <i>robusta</i> Tamura	センニンソウ
	<i>Ranunculus chinensis</i> Bunge	コキツネノボタン
	<i>R. quelpaertensis</i> Nakai	キツネノボタン
	<i>Thalictrum minus</i> L.	アキカラマツ
	<i>Cimicifuga simplex</i> Wasskjord	サラシナショウマ
	<i>Coptis japonica</i> Makino	オウレン
Berberidaceae	<i>Epimedium semperflorens</i> Nakai	トキワイカリソウ
	<i>E. semperflorens</i> Nakai var. <i>hypoglaucum</i> Ohwi	ウラジロイカリソウ
Menispermaceae	<i>Cocculus trilobus</i> A. P. de Candolle	アオツヅラフジ
	<i>Sinomenium acutum</i> Rehder et Wilson	ツヅラフジ
Lardizabalaceae	<i>Akebia quinata</i> Decaisne	アケビ
	<i>A. trifoliata</i> Koidz.	ミツバアケビ
Magnoliaceae	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	ホウノキ
	<i>M. salicifolia</i> Max.	タムシバ
Lauraceae	<i>Lindera obtusiloba</i> Blume	ダンコウバイ
	<i>L. umbellata</i> Thunb.	クロモジ
	<i>L. umbellata</i> Thunb. f. <i>membranacea</i> Makino	オオバクロモジ
	<i>Parabenzoin praecox</i> Nakai	アブラチャン
	<i>Neolitsea sericea</i> Koidz.	シロダモ
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> L. var. <i>asiaticum</i> Ohwi	クサノオウ
	<i>Macleaya cordata</i> R. Brown	タケニグサ
Cruciferae	<i>Rorippa indica</i> Hiern	イヌガラシ
Crassulaceae	<i>Sedum makinoi</i> Max.	マルバマンネングサ
Saxifragaceae	<i>Astilbe thunbergii</i> Miquel var. <i>congesta</i> H. Boissien	トリアシショウマ
	<i>Cardiandra alternifolia</i> Sieb. et Zucc.	クサアジサイ
	<i>Chrysoplrium flagelliferum</i> Fr. Schmidt.	ツルネコノメソウ

	<i>C. japonicum</i> Makino	ヤマネコノメソウ
	<i>Deutzia crenata</i> Sieb. et Zucc.	ウツギ
	<i>Hydrangea hirta</i> Sieb. et Zucc.	コアジサイ
	<i>H. macrophylla</i> Seringe f. <i>cuspidata</i> Hara	ヤマアジサイ
	<i>Mitella stylosa</i> Boissieu	チャルメルソウ
	<i>Rodgersia podophylla</i> A. Gray	ヤグルマソウ
	<i>Saxifraga fortunei</i> J. D. Hooker var. <i>incisolbata</i> Nakai	ダイモンジソウ
	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Sieb. et Zucc.	イワガラミ
Hamamelidaceae	<i>Hamamelis japonica</i> Sieb. et Zucc.	マンサク
	<i>H. japonica</i> Sieb. et Zucc. var. <i>bitchuensis</i> Ohwi	マルバマンサク
Rosaceae	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour var. <i>japonica</i> Nakai	キンミズヒキ
	<i>Chaenomeles japonica</i> Lindley	クサボケ
	<i>Duchesnea wallichiana</i> Nakai	ヘビイチゴ
	<i>Filipendula multiflora</i> Max.	シモツケソウ
	<i>Geum japonicum</i> Thunb.	ダイコンソウ
	<i>Kerria japonica</i> A. D. de Candolle	ヤマブキ
	<i>Potentilla kleiniana</i> Wight et Arnott	オヘビイチゴ
	<i>Prunus grayana</i> Max.	ウワミズザクラ
	<i>Rosa polyantha</i> Sieb. et Zucc.	ノイバラ
	<i>R. illecebrosus</i> Focke	バライチゴ
	<i>Rubus palmatus</i> Thunb. var. <i>coctophyllum</i> O. Kuntze	モミジイチゴ
	<i>R. wrightii</i> A. Gray	クマイチゴ
	<i>R. parvifolius</i> L.	ナワシロイチゴ
	<i>R. hakonensis</i> Fr. et Sav.	ミヤマフユイチゴ
	<i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>carnea</i> Regel	ワレモコウ
	<i>Sorbus gracilis</i> C. Koch	ナンキンナナカマド
Leguminosae	<i>Albizia julibrissin</i> Durazzini	ネムノキ
	<i>Cassia nomame</i> Honda	カワラケツメイ
	<i>Desmodium racemosum</i> A. D. de Candolle	ヌスピトハギ
	<i>Indigofera decora</i> Lindley	ニワフジ
	<i>I. pseudo-tictoria</i> Matsumura	コマツナギ
	<i>Kummerowia striata</i> Schindler	ヤハズソウ
	<i>Lespedeza cuneata</i> G. Don	メドハギ
	<i>L. penduliflora</i> Nakai	ミヤギノハギ
	<i>I. pilosa</i> Sied. et Zucc	ネコハギ

	<i>Maackia amurensis</i> Ruprecht et Max.	
	var. <i>buergeri</i> C. K. Schneider	イヌエンジュ
	<i>Pueraria lobata</i> Ohwi	クズ
	<i>Sophora angustifolia</i> Sieb. et Zucc.	クララ
	<i>Vicia cracca</i> L.	クサフジ
	<i>Wisteria brachylotrys</i> Sieb. et Zucc.	ヤマフジ
Geraniaceae	<i>Geranium nepalense</i> Swett. var. <i>thunbergii</i> Kudo	ゲンノショウコ
	<i>G. wilfordi</i> Max.	ミツバフウロ
Oxalidaceae	<i>Oxalis acetosella</i> L. subsp. <i>griffithii</i> Hara	ミヤマカタバミ
	<i>O. corniculata</i> L.	カタバミ
Rutaceae	<i>Boenninghausenia albiflora</i> Meissner var.	
	<i>japonica</i> S. Suzuki	マツカゼソウ
	<i>Orixa japonica</i> Thunb.	コクサギ
	<i>Zanthoxylum piperitum</i> A. P. de Candolle	サンショウ
	<i>Z. piperitum</i> A. P. de Candolle f. <i>brevispinum</i> Makino	ヤマアサクラザンショウ
	<i>Z. piperitum</i> A. P. de Candolle var. <i>iverme</i> Makino	アサクラザンショウ
Simaroubaceae	<i>Picrasma quassoides</i> Bennett var.	
	<i>glabrescens</i> Pampanini	ニガキ
Euphorbiaceae	<i>Acalypha australis</i> L.	エノキグサ
	<i>Mallotus japonicus</i> Muller, Arg.	アカメガシワ
	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miquel subsp.	
	<i>humile</i> Hurusawa	エゾユズリハ
	<i>Tithymalus adenochlorus</i> Hara	ノウルシ
Anacardiaceae	<i>Rhus ambigua</i> Lavallee	ツタウルシ
	<i>R. javanica</i> L.	ヌルデ
	<i>R. succedanea</i> L. var. <i>japonica</i> Engler	ハゼノキ
	<i>R. trichocarpa</i> Miquel	ヤマウルシ
Aceraceae	<i>Acer carpinifolium</i> Sieb. et Zucc.	チドリノキ
	<i>A. crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.	ウリカエデ
	<i>A. palmatum</i> Thunb.	イロハモミジ
	<i>A. palmatum</i> Thunb. subsp. <i>matsumurae</i> Koidz.	ヤマモミジ
	<i>A. rufinerve</i> Sieb. et Zucc.	ウリハダカエデ
Staphyleaceae	<i>Staphylea bumalda</i> A. P. de Candolle	ミツバウツギ
Hippocastanaceae	<i>Aesculus turbinata</i> Blume	トチノキ
Balsaminaceae	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	キツリフネ
	<i>I. textori</i> Miwuel	ツリフネソウ

Aquifoliaceae	<i>Ilex crenata</i> Thunb.	イヌツゲ
	<i>I. macropoda</i> Miquel	アオハダ
	<i>I. pedunculosa</i> Miquel	ソヨゴ
Celastraceae	<i>Euonymus alatus</i> Sieb. f. <i>ciliato-dertatus</i> Hiyama	コマユミ
	<i>E. japonicus</i> Thunb.	マサキ
	<i>E. melanathus</i> Fr. et Sav.	サワダツ
	<i>E. oxyphyllus</i> Miquel	ツリバナ
	<i>E. sieboldianus</i> Blume	マユミ
Vitaceae	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> Trautvetter var.	
	<i>heterophylla</i> Hara	ノブドウ
	<i>Cayratia japonica</i> Gagnepain	ヤブガラシ
	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planchon	ツタ
	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	サンカクヅル
Teaceae	<i>Camellia japonica</i> L.	ヤブツバキ
	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	ヒサカキ
Actinidiaceae	<i>Actinidia arguta</i> Planchon	サルナシ
	<i>A. polygama</i> Planchon	マタタビ
Guttiferae	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	オトギリソウ
Violaceae	<i>Viola grypoceras</i> A. Gray	タチツボスミレ
	<i>V. vaginata</i> Max.	スミレサイシン
	<i>V. verecunda</i> A. Gray	ツボスミレ
Stachyuraceae	<i>Stachyurus praecox</i> Sieb. et Zucc.	キブシ
Thymelaeaceae	<i>Edgeworthia chrysanthia</i> Lindley	ミツマタ
Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i> L. subsp. <i>anceps</i> Hara	ミソハギ
Onagraceae	<i>Trapa japonica</i> Flerov.	ヒシ
Alangiaceae	<i>Marles platanifolia</i> Sieb. et Zucc. var. <i>triloba</i> Miquel	ウリノキ
Araliaceae	<i>Acanthopanax japonicus</i> Fr. et Sav.	ヤマウコギ
	<i>A. sciadophylloides</i> Fr. et Sav.	コシアブラ
	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	ウド
	<i>A. elata</i> Seemann var. <i>canescens</i> Nakai	メダラ
	<i>Hedera rhombea</i> Sieb. et Zucc.	キヅタ
	<i>Kalopanax pictus</i> Nakai	ハリギリ
Umbelliferae	<i>Angelica decursiva</i> Fr. et Sav.	ノダケ
	<i>A. pubescens</i> Max.	シシウド
	<i>Chamaele decumbens</i> Makino	セントウソウ
	<i>Cryptotaenia canadensis</i> D. C.	ミツバ

	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lamarck	チドメグサ
	<i>Oenanthe javanica</i> A. P. de Candolle	セリ
	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	ウマノミツバ
	<i>Torilis scabra</i> A. P. de Candolle	オヤブジラミ
Cornaceae	<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	アオキ
	<i>A. japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudo	ヒメアオキ
	<i>Cornus controversa</i> Hemsley	ミズキ
	<i>Helwingia japonica</i> F. G. Dietrich	ハナイカダ
Clethraceae	<i>Clethra barbinervis</i> Sieb. et Zucc.	リョウブ
Ericaceae	<i>Epigaea asiatica</i> Max.	イワナシ
	<i>Eubotryoides grayana</i> Hara var. <i>oblongifolia</i> Hara	ハナヒリノキ
	<i>Lyonia elliptica</i> Okuyama	ネジキ
	<i>Rhododendron wadanum</i> Makino	トウゴクミツバツツジ
	<i>R. semibarbatum</i> Max.	バイカツツジ
	<i>R. kaempferi</i> Planchon	ヤマツツジ
	<i>Triptaleia bracteata</i> Max. var. <i>latifolia</i> Max.	ホツツジ
	<i>Vaccinium oldhami</i> Miq.	ナツハゼ
	<i>V. usunoki</i> Nakai	ウスノキ
	<i>V. smallii</i> A. Gray var. <i>glabrum</i> Koidz.	スノキ
Myrsinaceae	<i>Eladzia japonica</i> Hornstedt	ヤブコウジ
Primulaceae	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	オカトラノオ
Oleaceae	<i>Fraxinus japonica</i> Blume	トネリコ
	<i>F. lanuginosa</i> Koidz. var. <i>serrata</i> Hara	コバノトネリコ
	<i>Ligustrum obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.	イボタノキ
Gentianaceae	<i>Tripterispermum japonicum</i> Max.	ツルリンドウ
Apocynaceae	<i>Trachelospermum asiaticum</i> Nakai	ティカカヅラ
Asclepiadaceae	<i>Cynanchum caudatum</i> Max.	イケマ
	<i>Metaplexis japonica</i> Makino	ガガイモ
Convolvulaceae	<i>Calystegia japonica</i> Choisy	ヒルガオ
Boraginaceae	<i>Trigonotis brevipes</i> Max.	ミズタビラコ
Verbenaceae	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	ムラサキシキブ
	<i>C. japonica</i> Thunb. f. <i>angustata</i> Ohwi	ナガバノムラサキシキブ
Labiatae	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	キランソウ
	<i>Clinopodium chinense</i> O. Kuntze var. <i>pervirorum</i> Hara	クルマバナ
	<i>C. confine</i> O. Kuntze	トウバナ

	<i>Glechoma hederaceae</i> L. subsp. <i>grandis</i> Hara	カキドオシ
	<i>Isodon trichocarpus</i> Kudo	クロバナヒキオコシ
	<i>I. umbrosus</i> Hara	イヌヤマハッカ
	<i>Mentha arvensis</i> L. subsp. <i>piperascens</i> Hara	ハッカ
	<i>Mechanica urticifolia</i> Makino	ラショウモンカヅラ
	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> Hara	ウツボグサ
	<i>Salvia glabrescens</i> Makino	アキギリ
Gesneriaceae	<i>Conandron ramondioides</i> Sieb. et Zucc.	イワタバコ
Acanthaceae	<i>Dicliptera japonica</i> Makino	ハグロソウ
Phrymaceae	<i>Phryma leptostachya</i> L. var. <i>oblongifolia</i> Honda	ハエドクソウ
Plantaginaceae	<i>Plantago asiatica</i> L.	オオバコ
Rubiaceae	<i>Galium trachyspermum</i> A. Gray	ヨツバムグラ
	<i>G. kikumugura</i> Ohwi	キクムグラ
	<i>Mitchella repens</i> L. subsp. <i>undulata</i> Hara	ツルアリドウシ
	<i>Paederia scandens</i> Merrill var. <i>mairei</i> Hara	ヘクソカヅラ
	<i>Rubia akane</i> Nakai	アカネ
Caprifoliaceae	<i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>stenophylla</i> Handa	ウゴツクバネウツギ
	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	スイカヅラ
	<i>Sambucus chinensis</i> Lindley	ソクズ
	<i>S. racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> Hara	ニワトコ
	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.	ガマズミ
	<i>V. erosum</i> Thunb.	コバノガマズミ
	<i>V. wrightii</i> Miq.	ミヤマガマズミ
	<i>Weigela hortensis</i> K. Koch	タニウツギ
Valerianaceae	<i>Partinria villosa</i> Jussieu	オトコエシ
Cucurbitaceae	<i>Melothria japonica</i> Max.	スズメウリ
	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> Max.	カラスウリ
Campanulaceae	<i>Adenophora remotiflora</i> Miq.	ソバナ
	<i>A. triphylla</i> A. D. de Candolle var. <i>japonica</i> Hara	ツリガネニンジン
	<i>Campanula punctata</i> Lamarck	ホタルブクロ
Compositae	<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edzworth	ノブキ
	<i>Ainsliaea acerifolia</i> Schultz-Bipontinus	モミジバハグマ
	<i>A. apiculata</i> Schultz-Bipontinus	キッコウハグマ
	<i>Artemisia princeps</i> Pampanini	ヨモギ
	<i>Carpesium abrotanoides</i> L.	ヤブタバコ
	<i>Erigeron annuus</i> L.	ヒメジョオン

<i>Eupatorium chinense</i> L. var. <i>simplicifolium</i> Kitamura	ヒヨドリバナ
<i>E. chinense</i> L. subsp. <i>sachalinense</i> Kitamura	ヨツバヒヨドリ
<i>E. lindleyanum</i> A. P. de Candolle	サワヒヨドリ
<i>Ixeris dentata</i> Nakai	ニガナ
<i>I. stolonifera</i> A. Gray	ジシバリ
<i>Kalimeris yomena</i> Kitamura	ヨメナ
<i>Lactuca indica</i> L. var. <i>laeiniata</i> Hara	アキノノゲシ
<i>Ligularia fischeri</i> Turczaninow	オタカラコウ
<i>Macroclinidium rigidulum</i> Makino	クルマバハグマ
<i>Pertya scandens</i> Schultz-Bipontinus	コウヤボウキ
<i>Petasites japonicus</i> Max.	フキ
<i>Solidago virga-aurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> Kitamura	アキノキリンソウ
<i>Synurus pungens</i> Kitamura	オヤマボクチ
<i>Youngia denticulata</i> Kitamura	ヤクシソウ
Gramineae	
<i>Echinochloa crus-galli</i> Beauvois var. <i>candata</i> Kitagawa	イヌビエ
<i>Imperata cylindrica</i> Beauvois var. <i>koenigii</i>	
Durand et Schinz	チガヤ
<i>Misanthus sinensis</i> Andersson	ススキ
<i>Phragmites communis</i> Trinius var. <i>longivalvis</i> Miq.	ヨシ
<i>Sasa nipponica</i> Makino et Shibata	ミヤコザサ
<i>Setaria pumila</i> Roemer et Schultes	キンエノコロ
<i>S. viridis</i> Beauvois	エノコログサ
<i>S. viridis</i> Beauvois f. <i>misera</i> Honda	ムラサキエノコロ
Cyperaceae	
<i>Carex siderostita</i> Hance	タガネソウ
Araceae	
<i>Arisaema tosaense</i> Makino	アオテンナンショウ
<i>Pinellia ternata</i> Beeitenbach	カラスピシャク
Commelinaceae	
<i>Commelina communis</i> L.	ツユクサ
<i>Pollia japonica</i> Hornstedt	ヤブミョウガ
Liliaceae	
<i>Chionognaphis japonica</i> Max.	シライトソウ
<i>Disporum sessile</i> D. Don	ホウチャクソウ
<i>D. smilacinum</i> A. Gray	チゴユリ
<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel	ヤブカンゾウ
<i>Hosta montana</i> F. Maekawa	オオバギボウシ
<i>Heloniopsis orientalis</i> Tanaka	ショウジョウバカマ
<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.	オニユリ
<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker-Gawler	ジャノヒゲ

	<i>Polygonatum falcatum</i> A. Gray	ナルコユリ
	<i>P. macranthum</i> Koidz.	オオナルコユリ
	<i>Smilacina japonica</i> A. Gray	ユキザサ
	<i>Smilax china</i> L.	サルトリイバラ
	<i>S. higoensis</i> Miq. var. <i>maximowiczii</i> Kitagawa	シオデ
	<i>S. nipponica</i> Miq.	タチシオデ
	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	ヤマジノホトトギス
	<i>Trillium smallii</i> Max.	エンレイソウ
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea gracillima</i> Miq.	タチドコロ
	<i>D. japonica</i> Thunb.	ヤマノイモ
	<i>D. septemloba</i> Thunb.	キクバドコロ
	<i>D. tokoro</i> Makino	オニドコロ
Iridaceae	<i>Iris japonica</i> Thunb.	シャガ
Orchidaceae	<i>Cymbidium virescens</i> Lindley	ショウラン

北緯 36°18'、東経 136°49' に位置する足羽郡美山町は、標高 800m の山地を有する低山地帯で、ほぼ中央部を足羽川が流れている。美山町の東部は大野市、南部は今立郡池田村、西部は足羽郡の河和田村と足羽村、北部は松岡町、吉田郡の志比、上志比の両村、勝山市に各々接している。山地の大部分にはよく杉の植林がなされていて古いものでは 70~80 年生のものが見られる。局部的に自然林も見られ、ケヤキ、アカマツ林で、アカマツ林はヒカゲノカヅラ、アオハダ、ソヨゴ、スノキ、ウスノキ、トウゴクミツバツツジ、ネジキ、キブシ、アキノキリンソウ等より構成されていてスギ林とは異なり陽性植物景観を示す。沢沿いにはオニグルミ、ニガキ、クロバナヒキオコシ、ヤクシソウ等が多く、人家附近にはアカメガシワ、クサギが見られる。ミズナラ、コナラ等低山性植物の大木もなく、暖帯北部の植生を示しているといえる。(山麓帶の植生)。

分布量の目立つて多い、薬用植物は、傾斜の強いところに、ウラジロイカリソウ、トキワイカリソウ、谷沿いに、ニガキ、谷沿いの上部にはクロバナヒキオコシが非常に多いことは、薬用資源としては注目すべきことである。朝谷、赤谷の一部に《オウレン》を見ることができたが根茎の発育はよく美山町でも他地区と同じように杉林床下の《オウレン》栽培研究を進めるべきだ。その他割合に多産し利用し得るものにヨモギ、ゲンノショウコ、イノコズチ、オオバコ、オクマワラビ、ウツボグサ、オニグルミ、ヤマアサクラザンショウ等がある。当地方に見られる薬用植物は Lycopodiaceae (ヒカゲノカヅラ) Schizaceae (カニクサ) Aspleniaceae (クマワラビ、オクマワラビ) Saururaceae (ドクダミ) Juglandaceae (オニグルミ) Moraceae (コウゾ) Cannabinaceae (カナムグラ) Polygonaceae (ケイタドリ) Amaranthaceae (イノコズチ) Phytolaccaceae (ヨウシュヤマゴボウ) Ranunculaceae (ボタンヅル、ハンショウヅル、クサボタン、センニンソウ、アキカラマツ、オウレン、サラシナショウマ) Berberidaceae (トキワイカリソウ、ウラジロイカリソウ) Menispermaceae (アオツヅラフジ、ツヅラフジ) Lardizabalaceae (アケビ、ミツバアケビ) Magnoliaceae (ホオノキ、タムシバ) Lauraceae (オオバクロモジ、シロダモ) Papaveraceae (クサノオウ) Saxifragaceae (ウツギ、トリアシショウマ) Hamamelidaceae (マシサク) Rosaceae (キンミズヒキ、ワレモコウ) Leguminosae (カワラケツメイ、クズ、クサフジ、ヤマフジ) Geraniaceae (ゲンノショウコ) Rutaceae (マツカゼソウ、サンショウ、ヤマアサクラザンショウ、アサクラザン

ショウ) Simaroubaceae (ニガキ) Euphorbiaceae (アカメガシワ) Anacardiaceae (ヌルデ, ハゼノキ) Hypocrateaceae (トチノキ) Actinidiaceae (マタタビ) Guttiferae (オトギリソウ) Onagraceae (ヒシ) Araliaceae (ヤマウコギ, ウド, メダラ) Cornaceae (アオキ) Apocynaceae (ティカカヅラ) Asclepiadaceae (イケマ, ガガイモ) Labiate (カキドオシ, クロバナヒキオコシ, ハッカ, ウツボグサ) Rubiaceae (アカネ) Gesneriaceae (イワタバコ) Plantaginaceae (オオバコ) Caprifoliaceae (ソクズ, ニワトコ) Cucurbitaceae (カラスウリ) Campanulaceae (ツリガネニンジン) Compositae (ヨモギ, ヤブタバコ) Gramineae (チガヤ, ヨシ) Liliaceae (オニユリ, ナルコユリ, ヤマナルコユリ, エンレイソウ, ジャノヒゲ, サルトリイバラ) が見られる。薬用植物を含めて分布する植物は約 110 科, 360 有餘種を確認した。

本調査は福井県厚生部医務薬務課の依頼により行ったもので、現地においては美山町の皆様から便宜をはかりていただいたこと、又同行の本学学術講演部の諸兄姉、本学植物研究部員鈴木君の協力を感謝します。

