

資 料

水野瑞夫・田中俊弘・鈴木祥之：岐阜薬科大学臘葉目録 (7)
(植物分布地理研究)

羊齒植物目録(附・岐阜県のシダ植物)

Mizuo Mizuno, Toshihiro Tanaka, Shōshi Suzuki: List on the Herbarium
of Gifu College of Pharmacy (7)*

List of the Ferns in JAPAN

(Additional note: Flora Ferns in Pref. GIFU)

Psilotaceae

Psilotum nudum Griseb. マツバラン
琉球(石垣)

Lycopodiaceae

Lycopodium selago L. コスギラン
飛騨(上宝)

L. chinense Christ ヒメスギラン
伊勢(湯ノ山)

L. serratum Thunb. トウゲシバ
美濃(金華山, 三田洞, 伸越, 板取, 神崎, 養老), 阿波(高越山), 越前(足羽郡), 紀伊(那智, 尾鷲),
伊勢(湯ノ山)

L. serratum Thunb. var. *serratum* ホソバトウゲシバ
美濃(三田洞, 板取, 能郷, 金華山, 蝙ヶ野), 飛騨(上宝, 位山), 伊勢(大杉谷, 湯ノ山), 近江(伊吹山)

L. serratum Thunb. var. *serratum* f. *intermedium* Nakai ヒロハノトウゲシバ
近江(醒ヶ井)

L. serratum Thunb. var. *longpetiolatum* Spring オニトウゲシバ
紀伊(不動谷)

L. cryptomerinum Maxim. スギラン
美濃(日永岳), 飛騨(上宝村中崎山)

L. clavatum L. var. *nipponicum* Nakai ヒカゲノカヅラ
美濃(三田洞, 神崎, 板取, 能郷, 谷汲, 養老, 蝂ヶ野), 飛騨(位山, 上宝村), 伊勢(湯ノ山, 大台原山),
紀伊(尾鷲), 越前(足羽郡)

L. annotinum L. スギカヅラ
飛騨(上宝村)

L. obscurum L. マンネンスキ
美濃(板取, 能郷), 阿波(高越山), 伊勢(御在所岳), 飛騨(位山)

L. obscurum L. f. *obscurum* ウチワマンネンスキ
飛騨(上宝村)

L. sitchene Rupr. var. *nikoense* Takeda タカネヒカゲノカヅラ
飛騨(上宝村)

L. complanatum L. アスヒカヅラ
美濃(平家岳), 信濃(開田高原), 飛騨(上宝村, 位山)

* Mizuo Mizuno et al : This papers 16, 144-152 (1966)

L. inundatum L. ヤチスギラン
美濃（養老），飛騨（上宝村），伊勢（古浜村）

L. cernuum L. ミズスギ
伊勢（湯ノ山），紀伊（木津），琉球（石垣小浜島）

Selaginellaceae

Selaginella remotifolia Spring クラマゴケ
美濃（垂井，谷汲），越中（大岩），阿波（高越山），近江（醒ヶ井），紀伊（熊野），伊勢

S. doederleinii Hieron オニクラマゴケ
琉球（石垣）

S. involvens Spring カタヒバ
美濃（三田洞，神崎，谷汲），近江（伊吹山），伊勢（大杉谷），紀伊（尾鷲，熊野）琉球（石垣）

S. tamariscina Spring イワヒバ
伊勢（大杉谷）

Equisetaceae

Equisetum arvense L. スギナ
美濃（神崎，板取，能郷），近江（伊吹山），越前（足羽郡），阿波（高越山）

E. hyemale L. トクサ
E. ramosissimum Desf. var. *japonicum* Milde イヌドクサ
大和（金剛山）

Botrychiaceae

Sceptridium ternatum Lyon フユノハナワラビ
美濃（谷汲，三田洞，能郷，神崎），飛騨（位山，白山），近江（靈仙，伊吹山）

S. japonicum Lyon オオハナワラビ
美濃（神崎），紀伊（尾鷲）

Botrychium lunaria Sw. ヒメハナワラビ
Japonobotrychium virginianum Nishida ナツノハナワラビ

美濃（神崎，閑ヶ原），近江（醒ヶ井，伊吹山），越中（大岩）
J. strictum Nishida ナガボノナツノハナワラビ
越前（足羽郡）

Ophioglossaceae

Ophioglossum thermale Komarov var. *nipponicum* Nishida コハナヤスリ
美濃（本巣郡）

Angiopteridaceae

Angiopteris lygodiifolia Ros. リュウビンタン
琉球（石垣，沖縄本島），紀伊（熊野）

Osmundaceae

Osmunda japonica Thunb. ゼンマイ
美濃（金華山，三田洞，能郷，神崎），越中（大岩），尾張（犬山），越前（足羽郡），飛騨（位山），近江（伊吹山），伊勢（赤目），紀伊（尾鷲）

O. lancea Thunb. ヤシヤゼンマイ
Osmundastrum cinnamomea Pr. var. *fokiense* Tagawa ヤマドリゼンマイ

美濃（蛭ヶ野），飛騨（上宝村），近江（二日町）
Plenium banksiifolium Pr. シロヤマゼンマイ

琉球（沖縄本島）

Schizaeaceae

Lygodium japonicum Sw. カニクサ
美濃（金華山，三田洞，神崎，武儀），越中（大岩），阿波（高越山），越前（足羽郡），近江（伊吹山），大和（金剛山），武藏（太田区）

L. japonicum Sw. var. *microstachyum* C. Chr. et Tardieu-Blot ナガバカニクサ
琉球（沖縄本島）

Gleicheniaceae

Dicranopteris dichotoma Bernh. コシダ

美濃（金華山，三田洞，能郷），琉球（沖縄本島）

Gleichenia japonica Spr. ウラジロ

美濃（金華山，三田洞，板取，神崎，能郷），近江（伊吹山），伊勢（湯ノ山），琉球（沖縄本島）

G. laevissima Christ カネコシダ

肥前

Hymenophyllaceae

Mecodium wrightii Copel コケシノブ

美濃（神崎，日永岳，板取，能郷），越中（大岩），飛騨（上宝，位山，乘鞍岳），近江（醒ヶ井，伊吹山），越前（足羽郡）

M. polyanthos Copel ホソバコケシノブ

美濃（神崎，板取），紀伊（熊野）

M. oligosorum H. Ito キヨスミコケシノブ

美濃（神崎）

M. paniculiflorum Copel フジコケシノブ

M. badium Copel オオコケシノブ

遠江（春野町），伊勢（赤目滝）

Hymenophyllum barbatum Baker コウヤコケシノブ

美濃（神崎，日永岳，板取，金華山），近江（醒ヶ井），飛騨（位山），伊勢（湯ノ山），日向（宮崎）

Selenodesmium obscurum Copel オニホラゴケ

琉球（沖縄本島）

Gonocormus minutus v. d. B. ウチワゴケ

美濃（金華山，三田洞，神崎，板取），越前（足羽郡）

Vandenboschia radicans Copel ハイホラゴケ

美濃（神崎，板取，能郷），近江（醒ヶ井），紀伊（熊野）

V. auriculata Copel ツルホラゴケ

紀伊（相賀町），琉球（沖縄本島）

Pteridaceae

Dennstaedtia scabra Moore コバノイシカグマ

美濃（金華山，三田洞，神崎，仲越，板取），近江（醒ヶ井），越前（足羽郡），飛騨（位山），伊勢（湯ノ山），紀伊（尾鷲）

D. hirsuta Mett. イヌシダ

美濃（金華山，三田洞，神崎，谷合，板取，能郷，養老，谷汲），越中（大岩），近江（醒ヶ井，伊吹山），尾張（犬山），飛騨（位山）

D. wilfordii Christ オウレシダ

美濃（神崎），近江（靈仙岳，伊吹山），尾張（覚王山）

Microlepia marginata C. Chr. フモトシダ

美濃（金華山，三田洞，神崎，板取，谷汲），越中（大岩），近江（醒ヶ井，伊吹山），越前（足羽郡），紀伊（尾鷲）

M. pseudo-strigosa Makino フモトカグマ

紀伊（熊野）

M. strigosa Pr. イシカグマ

紀伊（尾鷲）

Monachosorum flagellare Hayata オオフジシダ

美濃（神崎，柿野，金華山），近江（醒ヶ井）

<i>Ptilopteris maximowiczii</i> Hance	フジシダ
美濃（金華山，恵那山），尾張，大和（大台ヶ原），飛騨（位山），伊勢（大杉谷）	
<i>Lindsaea cultrata</i> Sw.	ホングウシダ
紀伊（那智）	
<i>L. chienii</i> Ching	エダウチホングウシダ
琉球（沖縄本島）	
<i>Sphenomeris chusana</i> Copel.	ホラシノブ
美濃（三田洞，谷汲，神崎，金華山，関ヶ原），飛騨（白山），越中（大岩），近江（醒ヶ井），越前（足羽郡），紀伊（尾鷲），伊勢（湯ノ山），琉球（沖縄本島）	
<i>Hypolepis punctata</i> Mett.	イワヒメワラビ
美濃（神崎，能郷，板取，金華山），越中（大岩），近江（醒ヶ井，伊吹山），越前（足羽郡）	
<i>Pteridium aquilinum</i> Kuhn var. <i>latiusculum</i> Und.	ワラビ
美濃（三田洞，神崎，養老，金華山），近江（伊吹山），尾張（犬山），越前（足羽郡），飛騨（位山），伊勢（湯ノ山），紀伊（尾鷲）	
<i>Pteris vittata</i> L.	モエジマシダ
伊予（新居浜）	
<i>P. cretica</i> L.	オオバノイノモトソウ
美濃（金華山，板取，能郷，養老，神崎），近江（伊吹山，醒ヶ井），尾張（犬山），越前（足羽郡），紀伊（尾鷲）	
<i>P. multifida</i> Poir.	イノモトソウ
美濃（金華山，神崎，能郷），近江（伊吹山），尾張（犬山），越前（足羽郡）	
<i>P. ryukyuensis</i> Tagawa	リュウキュウイノモトソウ
琉球（沖縄本島）	
<i>P. dispar</i> Kunze	アマクサシダ
肥後，紀伊（尾鷲），伊豆（熱海）	
<i>P. inaequalis</i> Bak. var. <i>aequata</i> Tagawa	オオバノハチジョウシダ
美濃（関ヶ原，三田洞，神崎，仲越，板取，能郷，谷汲，恵那山），近江（醒ヶ井，伊吹山），紀伊（尾鷲）	
<i>P. fauriei</i> Hieron.	ハチジョウシダ
紀伊（尾鷲），琉球（沖縄本島）	
<i>P. kiuschiana</i> Ag.	コハチジョウシダ
紀伊（那智）	
<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.	ナチシダ
近江（靈仙岳，醒ヶ井，伊吹山），美濃（三田洞，仲越，板取，能郷，神崎，養老），阿波（高越山），飛騨（上宝），紀伊（尾鷲）	
<i>C. japonica</i> Diels	イワガネソウ
美濃（神崎，金華山，谷汲），越中（大岩），近江（伊吹山），越前（足羽郡），紀伊（尾鷲），大和	
<i>Cheilanthes chusana</i> Hook.	エビガラシダ
河内	
<i>C. kuhnii</i> Milde var. <i>brandtii</i> Tagawa	ミヤマウラジロ
<i>C. argentea</i> Kunze	ヒメウラジロ
上野	
<i>Onychium japonicum</i> Kunze	タチシノブ
美濃（三田洞，神崎，谷合，板取，能郷，養老，谷汲，大垣），阿波（高越山），近江（醒ヶ井，伊吹山），大和（金剛山）	
<i>Pleurosoriopsis makinoi</i> Fomin	カラクサシダ
近江（伊吹山）	

<i>Adiantum edgeworthii</i> Hook.	オトメクジャク
豊後	
<i>A. capillus-junonis</i> Rupr.	ホウライクジャク
<i>A. monochlamys</i> Eaton	ハコネシダ
美濃（神崎），阿波（高越山），相模，近江（伊吹山），伊勢（赤目滝），紀伊（尾鷲）	
<i>A. pedatum</i> L.	クジャクシダ
美濃（神崎，板取，能郷，養老），尾張（犬山），越前（足羽郡），近江（伊吹山）	

Parkeriaceae

<i>Ceratopteris thalictroides</i> Brongn.	ミズワラビ
美濃（羽島），琉球（石垣島）	

Davalliaceae

<i>Davallia mariesii</i> Moore	シノブ
美濃（三田洞，神崎，板取，能郷，養老山，白河，金華山），三河（海老），飛驒（位山），近江（伊吹山）	
<i>Humata repens</i> Diels	キクシノブ
紀伊	
<i>Nephrolepis auriculata</i> Trimen	タマシダ
紀伊（尾鷲，東牟婁郡），琉球（沖縄本島，石垣島，奄美大島）	
<i>N. beserrata</i> Schott	ホウビカンジユ
琉球（沖縄本島，石垣島）	

Plagiogyriaceae

<i>Plagiogyria adnata</i> Bedd.	タカサゴキジノオ
紀伊（熊野，尾鷲），琉球（沖縄本島）	
<i>P. japonica</i> Nakai	キジノオシダ
美濃（金華山，三田洞，板取，神崎，谷合，白河，小杉谷），近江（伊吹山），伊勢（湯ノ山），紀伊（尾鷲）	
<i>P. euphlebia</i> Mett.	オオキジノオ
美濃（三田洞，板取，神崎，仲越，谷汲，金華山，小杉谷，関ヶ原），近江（醒ヶ井，伊吹山），越前（足羽郡），伊勢（湯ノ山）	
<i>P. matsumureana</i> Makino	ヤマソテツ
美濃（能郷，板取，神崎，日永岳，小杉谷），越中（大岩），伊勢（御在所岳），飛驒（位山），近江（伊吹山）	

Cyattheaceae

<i>Cyathea fauriei</i> Copel.	ヘゴ
琉球（石垣島）	
<i>C. hancockii</i> Copel.	クサマルハチ
紀伊（九鬼町），琉球（石垣島）	

Aspidiaceae

<i>Matteuccia struthiopteris</i> Todaro	クサソテツ
美濃（板取），越中（大岩），羽前，飛驒（上宝村，位山），近江（靈仙岳，伊吹山），越前（足羽郡），上野（谷川岳）	
<i>M. orientalis</i> Trev.	イヌガンソク
美濃（三田洞，板取，能郷，谷合，金華山，養老，神崎），武藏（高尾山），越前（足羽郡），飛驒（位山），近江（伊吹山）	
<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	コウヤワラビ
飛驒（萩原），越前（足羽郡），尾張（名古屋），信濃（軽井沢）	
<i>Woodsia hancockii</i> Bak.	ケンザンデンダ
阿波（劍山）	
<i>W. macrochlaena</i> Mett.	コガネシダ
上野	

<i>W. polystichoides</i> Eaton	イワデンダ
美濃（能郷，養老，谷汲），越中（大岩），近江（伊吹山），甲府（北多摩郡多麻村）	
<i>W. manchuriensis</i> Hook.	フクロシダ
美濃（関ヶ原，伊吹山），阿波（高越山），駿河，近江（伊吹山）	
<i>Polystichum craspedosorum</i> Diels	ツルデシダ
美濃（神崎，水出，板取），近江（靈仙岳，彦根，伊吹山），尾張（石巻山）	
<i>P. tripteron</i> Pr.	ジュウモンジシダ
美濃（三田洞，神崎，谷合，仲越，板取，能郷，養老），近江（靈仙岳，伊吹山），飛騨（上宝村，位山），紀伊（新宮），伊勢（湯ノ山）	
<i>P. lachenense</i> Bedd.	タカネシダ
信濃	
<i>P. tsus-simense</i> J. Sm.	ヒメカナワラビ
美濃（神崎，谷合），近江（靈仙岳，醒ヶ井），紀伊（尾鷲）	
<i>P. tsus-simense</i> J. Sm. var. <i>mayebarae</i> Kurata	オオキヨズミシダ
美濃（神崎，久瀬）	
<i>P. pseudo-makinoi</i> Tagawa	サイゴクイノデ
美濃（神崎），近江（伊吹山）	
<i>P. manegatae</i> Kurata	ミツイシイノデ
近江（伊吹山）	
<i>P. tagawanum</i> Kurata	イノデモドキ
美濃（関ヶ原，神崎，仲越，板取），近江（伊吹山），伊勢（湯ノ山）	
<i>P. retroso-paleaceum</i> Tagawa	サカゲイノデ
美濃（三田洞，神崎，板取，能郷，養老，谷汲），飛騨（上宝村，位山），越中（大岩），越前（足羽郡），近江（醒ヶ井）	
<i>P. retroso-paleaceum</i> Tagawa var. <i>ovato-paleaceum</i> Tagawa	ツヤナシイノデ
美濃（関ヶ原，神崎，仲越，水出，板取，能郷），飛騨（位山），阿波（高越山），近江（伊吹山），伊勢（湯ノ山），上野（谷川岳），相模（箱根）	
<i>P. retroso-paleaceum</i> Tagawa var. <i>coraiense</i> Tagawa	イワシロイノデ
岩代	
<i>P. polyblepharum</i> Pr.	イノデ
美濃（金華山，三田洞，神崎，能郷，板取，谷汲，養老，大垣），越中（大岩），阿波（高越山），近江（伊吹山，醒ヶ井），紀伊（那智）	
<i>P. braunii</i> Fée	ホソイノデ
美濃（能郷），駿府（富士山）	
<i>P. microchlamys</i> Matsum.	カラクサイイノデ
美濃（能郷），飛騨（上宝村）	
<i>Cyrtomium falcatum</i> Pr.	オニヤブソテツ
紀伊（南部神島，尾鷲），琉球（沖縄本島）	
<i>C. fortunei</i> J. Sm.	ヤブソテツ
美濃（神崎，板取，能郷，養老，金華山），越中（大岩），近江（靈仙岳，醒ヶ井，伊吹山），尾張（犬山），武藏（高尾山）	
<i>C. fortunei</i> J. Sm. var. <i>clivicola</i> Tagawa	ヤマヤブソテツ
美濃（神崎），近江（伊吹山）	
<i>C. macrophyllum</i> Tagawa	ヒロハヤブソテツ
美濃（神崎），越前（足羽郡），伊豆（常蓮寺）	
<i>C. caryotideum</i> Pr.	メヤブソテツ
<i>C. balansae</i> C. Chr.	ミヤジマシダ
<i>Polystichopsis pseudo-aristata</i> Tagawa	コバノカナワラビ
紀伊（尾鷲）	

<i>P. aristate</i> Holtt.	ホソバカナワラビ
相模（江ノ島），紀伊（南部，尾鷲，熊野）	
<i>P. simplicior</i> Tagawa	ハカタシダ
美濃（神崎，白谷，水出，垂井，板取），武藏，筑後，伊勢（赤目滝）	
<i>P. simplicior</i> Tagawa var. <i>major</i> Tagawa	オニカナワラビ
美濃（神崎）	
<i>P. assamica</i> Tagawa	オトコシダ
紀伊（尾鷲）	
<i>P. nipponica</i> Tagawa	ミドリカナワラビ
駿河（梅ヶ島）	
<i>P. amabilis</i> Tagawa	オオカナワラビ
美濃（金華山），近江（伊吹山）	
<i>P. mutica</i> Tagawa	シノブカグマ
美濃（神崎，日永岳，板取，能郷），飛騨（上宝村，位山，乘鞍），越前（石徹白），伊勢（湯ノ山）	
<i>P. standishii</i> Tagawa	リョウメンシダ
美濃（三田洞，閑ヶ原，神崎，仲越，板取，能郷，谷汲，養老，金華山），飛騨（上宝村，位山），阿波（高越山），越後，越前（足羽郡），近江（伊吹山），伊勢（湯ノ山），武藏（高尾山）	
<i>P. miquelianiana</i> Tagawa	ナライシダ
美濃（金華山，仲越，谷合，板取，能郷），飛騨（上宝村），近江（伊吹山），伊勢（湯ノ山），大和（大台ヶ原）	
<i>Arachniodes subamabilis</i> Kurata	ヤマグチカナワラビ
<i>Bolbitis subcordata</i> Ching	ヘツカシダ
琉球（沖縄本島）	
<i>Elaphoglossum yoshinagae</i> Makino	アツイタ
紀伊	
<i>Dryopteris atrata</i> Ching	イワヘゴ
美濃（神崎，谷汲），越中（大岩），近江（伊吹山）	
<i>D. dickinsii</i> C. Chr.	オオクジャクシダ
美濃（仲越，谷合，板取，能郷，神崎，谷汲），越中（大岩），近江（醒ヶ井，伊吹山），越前（足羽郡），伊豆	
<i>D. tokyoensis</i> C. Chr.	タニヘゴ
陸奥，信濃，下野	
<i>D. monticola</i> C. Chr.	ミヤマベニシダ
美濃（板取），飛騨（位山）	
<i>D. kominatoensis</i> Tagawa	タニヘゴモドキ
陸奥	
<i>D. polylepis</i> C. Chr.	ミヤマクマワラビ
美濃（神崎），近江（伊吹山），阿波（高越山）	
<i>D. crassirhizoma</i> Nakai	オシダ
美濃（板取，能郷，日永岳，養老），飛騨（上宝村，位山），伊勢（鎌ヶ岳，御在所岳），上野（谷川岳），山城（比叡山）	
<i>D. coreano-montana</i> Nakai	カラフトメンマ
飛騨（上宝村）	
<i>D. uniformis</i> Makino	オクマワラビ
美濃（三田洞，神崎，板取，養老，金華山），尾張（犬山），近江（伊吹山，醒ヶ井），越前（足羽郡），伊勢（湯ノ山）	
<i>Dryopteris lacera</i> O. Kuntze	クマワラビ
美濃（三田洞，閑ヶ原，神崎，板取，能郷，養老，金華山，夏坂谷，谷汲，恵那山），越中（大岩），阿波（高越山），伊勢（湯ノ山）	

<i>D. sabaei</i> C. Chr.	ミヤマイタチシダ
美濃 (神崎, 板取), 飛騨 (上宝村, 位山), 伊勢 (御在所岳), 近江 (醒ヶ井, 伊吹山)	
<i>D. laeta</i> C. Chr.	イワカゲワラビ
陸中	
<i>D. austriaca</i> Woynar	シラネワラビ
美濃 (能郷), 飛騨 (上宝村, 乗鞍岳), 大和 (大台ヶ原)	
<i>D. pacifica</i> Tagawa	オオイタチシダ
美濃 (金華山, 谷合, 養老), 尾張 (犬山), 越前 (足羽郡), 伊勢 (赤目滝)	
<i>D. bissetiana</i> C. Chr.	ヤマイタチシダ
美濃 (神崎, 谷汲, 金華山), 近江 (伊吹山), 伊勢 (湯ノ山)	
<i>D. saxifraga</i> H. Ito	イワイタチシダ
美濃 (板取)	
<i>D. sacrosancta</i> Koidz.	ヒメイタチシダ
美濃 (神崎, 能郷), 越前 (足羽郡), 近江 (伊吹山), 伊勢 (湯ノ山)	
<i>D. fuscipes</i> C. Chr.	マルバベニシダ
美濃 (洞戸, 金華山)	
<i>D. nipponeensis</i> Koidz.	トウゴクシダ
美濃 (神崎)	
<i>D. erythrosora</i> O. Ktze.	ベニシダ
美濃 (金華山, 三田洞, 関ヶ原, 神崎, 養老, 大垣), 近江 (醒ヶ井, 伊吹山), 越前 (足羽郡), 伊勢 (湯ノ山, 赤目滝)	
<i>D. championii</i> C. Chr.	サイゴクベニシダ
美濃 (金華山, 垂井), 三河 (海老)	
<i>D. kinkiensis</i> Koidz.	ギフベニシダ
美濃 (金華山, 三田洞, 春日)	
<i>D. hondoensis</i> Koidz.	オオベニシダ
美濃 (金華山, 板取), 近江 (伊吹山), 伊勢 (御在所岳, 赤目滝)	
<i>D. indusiata</i> Makino et Yamam.	ヌカイタチシダモドキ
近江 (伊吹山)	
<i>D. shikokiana</i> C. Chr.	ホウノカワシダ
<i>Ctenitis maximowicziana</i> Ching	キヨスミヒメワラビ
美濃 (神崎)	
<i>C. subglandulosa</i> Ching	カツモウイノデ
琉球 (沖縄本島)	
<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> Fée	ゲジケジシダ
美濃 (三田洞, 神崎, 板取, 能郷, 養老, 谷汲, 金華山), 尾張 (犬山), 越前 (足羽郡), 近江 (伊吹山), 伊勢 (湯ノ山)	
<i>P. polypodioides</i> Fée	ミヤマワラビ
飛騨 (上宝村, 乗鞍)	
<i>Lastrea glanduligera</i> Moore	ハシゴシダ
美濃 (養老), 安芸 (広島), 紀伊 (南部)	
<i>L. miquelianana</i> Tagawa	コハシゴシダ
美濃 (三田洞, 谷汲), 琉球 (沖縄本島)	
<i>L. cystopteroides</i> Copel.	ヒメハシゴシダ
琉球 (沖縄本島)	
<i>L. nipponica</i> Copel.	ニツコウシダ
下野	
<i>L. japonica</i> Copel.	ハリガネワラビ

美濃 (三田洞, 神崎, 板取, 能郷, 金華山, 谷汲), 阿波 (高越山), 越前 (足羽郡), 飛騨 (位山), 近江 (伊吹山)	
<i>L. japonica</i> Copel var. <i>musashiensis</i> Hiyama 飛騨 (上宝村, 位山), 近江 (伊吹山)	イワハリガネワラビ
<i>L. thelypteris</i> Bory 越中 (大岩), 近江 (伊吹山)	ヒメシダ
<i>L. subochthodes</i> Tagawa 美濃 (神崎, 能郷, 谷汲), 近江 (靈仙岳, 醒ヶ井, 伊吹山), 紀伊 (尾鷲, 新宮)	イブキシダ
<i>L. quelpaertensis</i> Copel. 美濃 (能郷), 飛騨 (上宝村), 近江 (靈仙岳)	オオバショリマ
<i>L. laxa</i> Copel. 美濃 (金華山, 三田洞, 神崎, 板取, 能郷, 谷汲), 越中 (大岩), 阿波 (高越山), 飛騨 (上宝村, 位山), 安芸 (広島)	ヤワラシダ
<i>L. oligophlebis</i> Copel. var. <i>elegans</i> Tagawa 美濃 (能郷, 神崎, 谷合, 谷汲), 三河 (海老), 越前 (足羽郡), 近江 (伊吹山), 紀伊 (東牟婁郡)	ヒメワラビ
<i>L. viridifrons</i> Tagawa 美濃 (神崎, 谷汲), 近江 (伊吹山)	ミドリヒメワラビ
<i>Leptogramma mollissima</i> Ching 美濃 (三田洞, 関ヶ原, 神崎, 板取, 能郷, 春日, 金華山, 谷汲), 越中 (大岩), 近江 (醒ヶ井, 伊吹山), 大和 (金剛山)	ミヅシダ
<i>L. amabilis</i> Tagawa 肥前	ヒメミヅシダ
<i>Gymnocarpium oyamense</i> Ching 駿河 (梅ヶ島), 土佐	エビラシダ
<i>Cyclosorus gongyloides</i> Link 琉球 (石垣島)	テツホシダ
<i>C. acuminatus</i> Nakai 美濃 (神崎, 養老), 近江 (靈仙岳, 伊吹山, 醒ヶ井), 紀伊 (熊野), 琉球	ホシダ
<i>C. parasiticus</i> Farwell 琉球 (沖縄本島)	ケホシダ
<i>Abacopteris triphylla</i> Ching 琉球 (沖縄本島)	コウモリシダ
<i>Dictyocline griffithii</i> Moore var. <i>wilfordii</i> Moore 紀伊 (尾鷲)	アミシダ
<i>Acystopteris japonica</i> Nakai 美濃 (神崎, 金華山, 郡上郡), 大和 (大台ヶ原), 近江 (醒ヶ井), 飛騨 (位山)	ウスヒメワラビ
<i>Athyrium melanolepis</i> Christ 飛騨 (上宝村)	ミヤマメシダ
<i>A. deltoides</i> Makino 飛騨 (位山), 越前 (足羽郡), 近江 (伊吹山)	サトメシダ
<i>A. pinetorum</i> Tagawa 美濃 (能郷), 甲斐	タカネサトメシダ
<i>A. alpestre</i> Rylands 飛騨 (上宝村)	オクヤマワラビ
<i>A. yokoscense</i> Christ 美濃 (神崎, 板取, 能郷, 養老, 金華山), 駿河, 飛騨 (上宝村, 位山), 近江 (伊吹山), 伊勢 (御在所岳)	ヘビノネゴザ
<i>A. vidalii</i> Nakai 美濃 (能郷, 神崎, 谷汲), 近江 (醒ヶ井, 伊吹山), 越前 (足羽郡), 飛騨 (位山), 伊勢 (湯ノ山)	ヤマイヌワラビ

<i>A. clivicola</i> Tagawa	カラクサイヌワラビ
美濃 (神崎), 飛騨 (位山), 近江 (伊吹山)	
<i>A. wardii</i> Makino	ヒロハノイヌワラビ
美濃 (板取, 能郷, 神崎, 養老), 飛騨 (上宝村), 越前 (足羽郡), 近江 (伊吹山)	
<i>A. wardii</i> Makino var. <i>inadae</i> Tagawa	ルリデライヌワラビ
播磨	
<i>A. niponicum</i> Hance	イヌワラビ
美濃 (神崎, 板取, 能郷, 土岐津, 養老, 谷汲, 金華山), 飛騨 (益田), 越中 (大岩), 尾張 (犬山), 近江 (醒ヶ井, 伊吹山), 越前 (足羽郡), 紀伊 (尾鷲), 伊勢 (赤目瀧)	
<i>A. otophorum</i> Koidz.	タニイヌワラビ
美濃 (神崎, 能郷), 越前 (足羽郡), 近江 (伊吹山), 紀伊 (尾鷲, 熊野)	
<i>A. shearerii</i> Ching	ウラボシノコギリシダ
近江 (靈仙岳), 美濃 (関ヶ原), 紀伊 (尾鷲)	
<i>A. tozanense</i> Hayata	ホウライイヌワラビ
因幡	
<i>A. iseanum</i> Ros.	ホソバイヌワラビ
美濃 (能郷, 垂井, 金華山, 谷汲), 越中 (大岩), 近江 (伊吹山), 紀伊 (尾鷲)	
<i>A. eremicola</i> Oka et Kurata	ハイケイヌワラビ
石見	
<i>A. frangulum</i> Tagawa	ミヤコイヌワラビ
美濃 (神崎)	
<i>A. frangulum</i> Tagawa f. <i>viride</i> Kurata	ダンドイヌワラビ
<i>A. mesosorum</i> Makino	ヌリワラビ
美濃 (神崎, 能郷), 近江 (靈仙岳, 伊吹山), 越中 (大岩), 阿波 (高越山)	
<i>A. atkinsonii</i> Bedd.	テバコワラビ
美濃 (伊吹山)	
<i>A. squamigerum</i> Ohwi	キヨタキシダ
美濃 (神崎, 板取, 能郷), 越中 (大岩), 阿波 (高越山), 飛騨 (上宝村, 位山), 大和 (大台ヶ原), 近江 (伊吹山), 伊勢 (湯ノ山), 伊豆 (淨蓮寺)	
<i>A. japonicum</i> Copel.	シケシダ
美濃 (金華山, 三田洞, 神崎, 能郷, 養老, 大垣), 越中 (大岩), 尾張 (犬山), 越前 (足羽郡), 飛騨 (位山), 近江 (伊吹山)	
<i>A. pycnosorum</i> Christ	ミヤマシケシダ
美濃 (神崎, 板取, 能郷), 越中 (大岩), 阿波 (高越山), 近江 (伊吹山)	
<i>A. pterorachis</i> Christ	オオメシダ
飛騨 (上宝村)	
<i>A. unifurcatum</i> C. Chr.	オオヒメワラビモドキ
美濃 (神崎), 越中 (大岩), 近江 (醒ヶ井, 伊吹山)	
<i>A. okuboanum</i> Makino	オオヒメワラビ
美濃 (板取, 能郷, 神崎), 近江 (靈仙岳, 伊吹山)	
<i>Cornopteris decurrenti-alata</i> Nakai	シケチシダ
美濃 (三田洞, 神崎, 板取, 谷汲, 金華山), 越中 (大岩), 近江 (伊吹山)	
<i>C. decurrenti-alata</i> Nakai var. <i>pilosella</i> H. Ito	タカオシケチシダ
越前 (足羽郡)	
<i>C. crenulatoserrulata</i> Nakai	イッポンワラビ
美濃 (能郷), 駿河 (安倍峠), 近江 (伊吹山)	
<i>Diplazium subsinuatum</i> Tagawa	ヘラシダ
大隅 (高隈山), 美濃 (金華山), 紀伊 (南部, 尾鷲, 熊野), 肥後, 琉球 (沖縄本島)	

<i>D. tomitaroanum</i> Masam.	ノコギリヘラシダ
大隅（高隈山）	
<i>D. donianum</i> Tard.	キノボリシダ
琉球（沖縄本島）	
<i>D. wichurae</i> Diels	ノコギリシダ
美濃（神崎），紀伊（南部，那智，尾鷲）	
<i>D. okudairae</i> Makino	イヨクジャク
紀伊（尾鷲）	
<i>D. mettienianum</i> C. Chr.	ミヤマノコギリシダ
美濃（神崎，金華山），近江（伊吹山），伊勢（湯ノ山，赤目滝），紀伊（尾鷲）	
<i>D. dilatatum</i> Bl.	ヒロハノコギリシダ
<i>D. hachijoense</i> Nakai	シロヤマシダ
美濃（板取），越前（足羽郡），近江（伊吹山），紀伊（熊野），琉球（沖縄本島）	
<i>D. nipponicum</i> Tagawa	オニヒカゲワラビ
越前（足羽郡）	
<i>D. bittyuense</i> Tagawa	ビッチュウヒカゲワラビ
遠江	
<i>Diplaziopsis cavaleriana</i> C. Chr.	イワヤシダ
美濃（神崎）	

Blechnaceae

<i>Blechnum orientale</i> L.	ヒリュウシダ
琉球（沖縄本島）	
<i>Struthiopteris castanea</i> Nakai.	ミヤマシシガシラ
美濃（根尾村）	
<i>S. amabilis</i> Ching	オサシダ
美濃（神崎，日永岳，板取，養老），近江（醒ヶ井），伊勢（湯ノ山）	
<i>S. niponica</i> Nakai	シンガシラ
美濃（金華山，三田洞，神崎，仲越，日永岳，板取，能郷，養老，権現山），越中（大岩），飛騨（上宝村，位山）	
<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	コチモシダ
近江（醒ヶ井），大和（金剛山），紀伊（尾鷲，熊野）	
<i>W. orientalis</i> Sw. var. <i>formosana</i> Ros.	タイワンコモチシダ
琉球（沖縄本島）	
<i>W. unigemmata</i> Nakai	ハイコモチシダ
伊豆	

Aspleniaceae

<i>Asplenium antiquum</i> Makino	オオタニワタリ
<i>A. nidus</i> L.	シマオオタニワタリ
琉球（石垣島）	
<i>A. normale</i> Don	ヌリトラノオ
美濃（金華山，神崎），近江（醒ヶ井）	
<i>A. normale</i> Don var. <i>boreale</i> Ohwi	シモツケヌリトラノオ
美濃（三田洞）	
<i>A. oligophlebium</i> Bak.	カミガモシダ
美濃（神崎），山城，近江（醒ヶ井）	
<i>A. tripteropus</i> Nakai	イヌチヤセンシダ
美濃（神崎）	
<i>A. trichomanes</i> L.	チヤセンシダ

美濃（関ヶ原，養老，谷汲），近江（靈仙岳，醒ヶ井，伊吹山），越中（大岩），阿波（高越山），越前（足羽郡）

A. viride Huds. アオチヤセンシダ

飛騨（上宝村），信州（豊口山），武藏（奥秩父）

A. incisum Thunb. トラノオシダ

美濃（金華山，三田洞，神崎，板取，能郷，谷汲，養老，大垣），飛騨（上宝村），近江（伊吹山），越前（足羽郡），紀伊（尾鷲）

A. wrightii Eat. クルマシダ

紀伊（那智，尾鷲，熊野）

A. prolongatum Hook. ヒノキシダ

紀伊（熊野，新宮）

A. wilfordii Mett. アオガネシダ

紀伊（尾鷲）

A. pseudo-wilfordii Tagawa オクタマシダ

美濃（神崎）

A. sarelii Hook. コバノヒノキシダ

美濃（神崎，仲越，能郷），近江（靈仙岳，伊吹山），阿波（高越山），紀伊（尾鷲）

A. varians Wall. イワトラノオ

近江（醒ヶ井），駿河（梅ヶ島）

A. unilaterale Lam. ホウビシダ

紀伊（尾鷲）

A. ruta-muraria L. イチョウシダ

近江（伊吹山）

Phyllitis scolopendrium Newm. コタニワタリ

美濃（神崎，能郷），飛騨（白山，位山），近江（伊吹山）

Camptosorus sibiricus Rupr. クモノスシダ

美濃（神崎，谷合），近江（伊吹山）

Cheiroleuriaceae

Cheiroleuria bicuspis Pr. スジヒトツバ

肥前，琉球（沖縄本島）

Polypodiaceae

Polypodium virginianum L. エゾデンダ

石狩

P. fauriei Christ オシャグシデンダ

美濃（神崎，板取，能郷），飛騨（位山），近江（伊吹山），伊勢（鎌ヶ岳，湯ノ山）

P. niponicum Mett. アオネカヅラ

美濃（神崎，水鳥谷），琉球（沖縄本島），伊豆（天城山）

P. someyae Yatabe ミヨウギシダ

上野

Lepisorus uchiyamae H. Ito コウラボシ

紀伊（尾鷲），琉球（沖縄本島）

L. annuifrons Ching ホテイシダ

美濃（板取，能郷，恵那山），飛騨（位山）

L. ussuriensis Ching var. *distans* Tagawa ミヤマノキシノブ

美濃（日永岳，板取），近江（伊吹山），伊勢（鎌ヶ岳），大和（金剛山）

L. onoei Ching ヒメノキシノブ

美濃（神崎，日永岳，板取，金華山，柿野），近江（伊吹山）

L. thunbergianus Ching ノキシノブ

美濃（金華山，三田洞，仲越，板取，白河，養老），飛驥（上宝村，位山），越中（大岩），阿波（高越山），尾張（犬山），越前（足羽郡），近江（伊吹山），紀伊（尾鷲），甲府（北多摩郡村土小倉）

<i>Drymotaenium miyoshianum</i> Makino 美濃（恵那）	クラガリシダ
<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Pr. 美濃（金華山，神崎，板取），阿波（高越山），尾張（犬山），近江（伊吹山），紀伊（那智，尾鷲）	マメヅタ
<i>L. microphyllum</i> Pr. var. <i>obovatum</i> C. Chr. 琉球（沖縄本島）	リュウキュウマメヅタ
<i>Neochiroppteris ensata</i> Ching 美濃（神崎，谷合，養老），近江（靈仙岳，醒ヶ井），紀伊（尾鷲，相賀町）	クリハラン
<i>L. subhastata</i> Tagawa 美濃（神崎）	ヤノネシダ
<i>Pyrrosia linearifolia</i> Ching 美濃（神崎，板取，水鳥谷），近江（靈仙岳，伊吹山），尾張（犬山），駿河（富士山）	ビロウドシダ
<i>P. lingua</i> Farwell 美濃（金華山，三田洞，神崎，岐阜），伊勢，尾張（犬山），紀伊（那智，熊野），琉球（沖縄本島）	ヒトツバ
<i>P. tricuspis</i> Tagawa 尾張（犬山），近江（伊吹山）	イワオモダカ
<i>P. pekinensis</i> Ching 尾張（犬山）	イワダレヒトツバ
<i>Microsorium buregerianum</i> Ching 紀伊（熊野），琉球（沖縄本島）	ヌカボシクリハラン
<i>Colysis wrightii</i> Ching 琉球（沖縄本島）	ヤリノホクリハラン
<i>C. pothifolia</i> Pr. 紀伊（南部，神内村），琉球（沖縄本島）	オオイワヒトデ
<i>C. elliptica</i> Ching 紀伊（熊野）	イワヒトデ
<i>Crypsinus engleri</i> Copel. 紀伊（熊野，尾鷲）	タカノハウラボシ
<i>C. hastatus</i> Copel. 美濃（三田洞，神崎，板取，能郷，谷汲，岩戸），阿波（高越山），近江（伊吹山），尾張（犬山），伊勢（湯ノ山），三河（篠島）	ミツデウラボシ
<i>Loxogramme saziran</i> Tagawa 美濃（日永岳，柿野，神崎，仲越，板取），近江（靈仙岳，伊吹山）	サジラン
<i>L. salicifolia</i> Makino 紀伊（熊野），琉球（沖縄本島）	イワヤナギシダ
<i>L. grammitoides</i> C. Chr. 美濃（仲越，能郷，洞戸，神崎），近江（靈仙岳）	ヒメサジラン
Grammitidaceae	
<i>Xiphopteris okuboi</i> Copel. 伊勢（御在所岳），大和（大台ヶ原）	オオクボシダ
Vittariaceae	
<i>Vittaria fudzanoi</i> Makino 美濃（八幡）	ナカミシシラン
<i>V. flexuosa</i> Féé 美濃（金華山，三田洞，神崎，谷合），紀伊（熊野），琉球（沖縄本島）	シシラン

岐阜県のシダ植物

地形・地質

岐阜県は日本のほぼ中央に位置し、アジアの温帯モンスーン帯の東端にある。四隅を愛知、長野、富山、石川、福井、滋賀、三重の各県に接し、海岸をもたない県である。東部はフォッサマグナ地区に接し、南部は諏訪湖付近に端を発し、愛知県南部から紀伊半島を経て九州に至る中央構造線があり、古代のソハヤキ山脈の北側に位置している。

岐阜県は北部(飛騨)と南部(美濃)に二大別することができる。¹⁾飛騨地方の東側は飛騨山地で、西側は白山山塊からなり、その間は中世の地質よりなる高原である。

美濃地方は西南部が広大なる平野からなり、木曽川の南側にひろがる美濃三河山地は準平原化をうけた平坦な地域で、大部分は花崗岩、砂岩より構成されている。長良川と木曽川の間の山地は飛騨美濃山地といわれ、長良川以西の山である美濃越前山地とともに秩父古生層が分布している。飛騨美濃山地の西部は壯年期の比較的けわしい山地であるが、東部は斑岩系火成岩類が分布し、前者に比して比較的温和な山容を呈している。美濃越前山地で比較的峻険な山岳をつくっているのは風化を受け難いチャートであり、ゆるやかな山地は風化をされ易い砂岩系である。西濃地方には石灰岩からなる山地が多く、しばしばその露出地を見ることがある。

植物概要

岐阜県の植物相は、県南部はヤブツバキ・シラカシ・アラカシ・ツブライ・ミズナラ・コナラ・ベニシダからなる暖帶林が占有する地帯で美濃山間部にまで至っている。暖帶林につづく北部山地ではブナ、*Acer* spp. よりなる温帯林となり飛騨西部の白山山系、東部の北アルプス～中央アルプスに至る地域には寒地性要素が富み、また高山植物が広く分布している。²⁾したがって飛騨地区の植物相と美濃地方とを区別して飛騨植物亜区とする説がある。³⁾また奥美濃地方の植物相に関しては、北方系分子の多い大日岳植物区と南方系分子の多い伊吹山植物区にわけ、その中央でその両因子を共有する地域を能郷白山植物区としている。

シダ植物の概要

岐阜県のシダ植物に関する研究および資料には吉永、岐阜薬専植物同好会、吉田、岐阜薬大植物研究部、井波、⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾みどり植物同好会、嶋野等、小野木、水野等、金子、松本、香田の報告がある。⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾

- 1) 牛丸周太郎：岐阜県の植物 (1966)
- 2) 山崎敬：自然科学と博物館 **26**, 1～19 (1959)
- 3) 水野瑞夫：登山 **2**, 37～39 (1958)
- 4) 吉永悦郷：植雜 **18**, 207～208 (1904), **20**, 159～160 (1906)
- 5) 金華山並山麓植物目録 (1934), 養老山植物目録 (1934), 関ヶ原植物目録 (1936)
- 6) 吉田裕：岐阜県産薬用植物の植物地理学的考察並びにその利用研究 (1941)
- 7) 金華山植物目録 (1952), 神崎の植物 (1967)
- 8) 井波一雄：美濃金華山羊歯植物目録 (1952), 岐阜県の植物 48～52 (1966)
- 9) 伊吹山の植物 (1～3合目) (1962)
- 10) 嶋野武、水野瑞夫：本紀要 **12**, 69 (1962); **12**, 76 (1962), **14**, 85 (1964)
- 11) 小野木三郎：秋神川流域の植物 (1963)
- 12) 水野瑞夫、浅野恵司、田中俊弘：日本シダの会会報 No. 72 (1965), 水野瑞夫、田中俊弘、鈴木祥之：日本シダの会会報 No. 86 (1967), 水野瑞夫、田中俊弘、嶋野武、松浦信：本紀要 **16**, 144 (1966)
- 13) 金子弘之：はざこ **3**, 138 (1966)
- 14) 松本一郎：養老の植物 (1964)
- 15) 香田寿男：揖斐のシダ植物 (ガリ版刷・1967)

美濃平野部は水田が発達しているが、堤防路傍には陽地性のイヌワラビ・ホシダがみられ。スギナはいたるところにみられる。民家近くのタケ^{ヤシ}家敷林叢にはオシダ科のシダ類を多くみることができる。ことにベニシダ・ヤブソテツが多い。まれにオオベニシダ・クマワラビがある。その他イノモトソウ・イヌシダ・トラノオシダがあるが、オオバノイノモトソウは見つけ難い。向陽の草地にはワラビもみられ、湿地にはミズワラビの群落がまれにみられる(羽島市)。池沼にはアカウキクサ・オオアカウキクサ・サンショウモなどの水生シダも分布する。

山麓地方ではベニシダ・ヒメイタチシダ・ヤブソテツ・ホラシノブ・タチシノブ・イヌワラビ・ヒロハイヌワラビ・ヤマイヌワラビ・タニイヌワラビなどが普通にみられる。やや稀にギフベニシダも分布する。

山間渓側の向陽地にはホシダ・イブキシダ、渓側の湿性地にはヒメシダがあり、コウヤワラビは稀である。陰地にはイヌワラビ類・イノデ・シュウモンシダ・イワガネソウ・イワガネゼンマイ・キジノオシダ・オオキジノオが、コウヤコケシノブ・ホソバコケシノブ・ウチワゴケは蘚類と混って岩壁に生ずる。標高500~800mではクサソテツ・イヌガンソクが優勢となり、スギやヒノキの植林下にはイノデ・ミヅシダ・クジャクシダがある。サカゲイノデ・ツヤナシイノデ・リョウメンシダ・ミヤマベニシダは植林下層草本帯の大部分を占めているが、シダ植生は山麓地帯よりシンプルになる。シラカシーアラカシなどの群集下にはイノデ・ベニシダが出現し、南部の暖地にはオオカナワラビ・オニカナワラビ・ヘラシダも見られる。アカマツ林下の陽地にはワラビ、コシダをみることができる。標高500~800mの斜面でイヌブナ・ミズナラ・コナラ・Acer spp.などの広葉樹林下にはナライシダ・シノブカグマ・クジャクシダがみられ、ヤマソテツも出現する。

標高1000m附近以上にはサトメシダ・テバコワラビ・ミヤマクマワラビが、東部の高山地帯にはミヤマメシダ・オオバショリマ・コスギラン・タカネヒカゲノカヅラ・ヘビノネゴザ・イッポンワラビ・テバコワラビが分布する。

¹⁵⁾ 美濃南部にはアオホラゴケ・コモチシダ・オオクボシダ・コハシゴシダが稀産し、養老山脈の南端多度地区には¹⁶⁾ ナチシダ、¹⁷⁾ 美濃東部鶴沼に南接する犬山市にはイワダレヒトツバが採られている。¹⁸⁾ 美濃西部鈴鹿山脈の北端靈仙岳山麓の醒ヶ井にはキヨスミヒメワラビ・イワヤシダ・カミガモシダの他70余種のシダが分布する。融離分布をしているクラガリシダ¹⁹⁾ は東濃地方にビッチュウヒカゲワラビは神崎、揖斐の両地域に分布する。²⁰⁾ 神崎にはイワヤシダ・イヨウシャクがあり、オクタマシダは稀産である。円原川一神崎川一武儀川の一帯にはヤノネシダが分布しこれは日本における分布の北限に近いと考えられる。

¹³⁾ ¹²⁾ ¹⁵⁾ ⁵⁾ 県内でシダ植物の分布が豊富である郡上郡南部、山県郡神崎川流域、揖斐郡南部、岐阜市金華山、近江・美濃国境の伊吹山には110~180種のシダが知られている。この地域は、一般に降水量も多く、秩父古生層のチャートや石灰岩も入り組んだ地帯であり気温は12~14°Cである。温帶から暖帯にかかる地域で、またこの地域は県下のヒトツバ自生の分布北限、年平均気温12°Cの等温線とよく一致している。年降水量は2500mmに達する。(Fig7)

岐阜県産シダ目録

Lycopodiaceae *Lycopodium selago* L. (コスギラン), *L. chinense* Christ (ヒメスギラン), *L. serratum* Thunb. (トウゲシバ), *L. serratum* Thunb. var. *serratum* (ホソバトウゲシバ), *L. serratum* Thub. var.

- 16) 井波一雄: 名古屋の自然 (1965)
- 17) 水野瑞夫: 北陸の植物 **13**, 52~56 (1964)
- 18) 水野瑞夫, 田中俊弘: 植物趣味 **25**, 2~5 (1964)
- 19) 岐阜県加茂郡東白川村越原にて後藤芳夫氏の採集品がある。
- 20) 桑原道衛氏の私信による。
- 21) 水野瑞夫, 田中俊弘, 鈴木祥之: 伊吹山のシダ植物 (未発表)

serratum f. *intermedium* Nakai (ヒロハトウゲシバ), *L. cryptomerinum* Maxim. (スギラン), *L. clavatum* L. var. *nipponicum* Nakai (ヒカゲノカヅラ), *L. obscurum* L. (マンネンスギ), *L. obscurum* L. f. *obscurum* (ウチワマンネンスギ), *L. sitchense* Rupr. var. *nikoense* (Fr. et Sav.) Takeda (タカネヒカゲノカヅラ), *L. complanatum* L. (アスピカヅラ), *L. inundatum* L. (ヤチスギラン), *L. cernuum* L. (ミズスギ)

Selaginellaceae *Selaginella shakotanensis* (Franch.) Miyabe et Kudo (ヒモカズラ), *S. nipponica* Fr. et Sav. (タチクラマゴケ), *S. remotifolia* Spring (クラマゴケ), *S. involvens* (Sw.) Spring (カタヒバ), *S. tamariscina* (Beauv.) Spring (イワヒバ), *S. heterostachys* Bak. (ヒメクラマゴケ)

Equisetaceae *Equisetum arvense* L. (スギナ), *E. palustre* L. (イヌスギナ), *E. limosum* L. (ミズドクサ), *E. hyemale* L. (トクサ), *E. ramosissimum* Desf. var. *japonicum* Milde (イヌドクサ)

Botrychiaceaa *Sceptridium ternatum* (Thunb.) Lyon (フユノハナワラビ), *S. japonicum* (Prantl) Lyon (オオハナワラビ), *Japanobotrychium virginianum* (L.) Nishida (ナツノハナワラビ), *J. strictum* (Und.) Nishida (ナガホノナツノハナワラビ)

Ophioglossaceae *Ophioglossum vulgatum* L. (ヒロハハナヤスリ), *O. thermale* Komarov. var. *nipponicum* (Miyabe et Kudo) Nishida (コハナヤスリ)

Osmundaceae *Osmunda japonica* Thunb. (ゼンマイ), *O. lancea* Thunb. (ヤシャゼンマイ), *O. lancea* Thunb. var. *latipinnula* Tagawa (オオバヤシャゼンマイ), *Osmundastrum cinnamomeum* (L.) Pr. var. *fokiense* (Copel.) Tagawa (ヤマドリゼンマイ)

Schizaeaceae *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. (カニクサ)

Gleicheniaceae *Dicranopteris dichotoma* (Thunb.) Bernh. (コシダ), *Gleichenia japonica* Spr. (ウラジロ)

Hymenophyllaceae *Mecodium wrightii* (v. d. B.) Copel. (コケシノブ), *M. polyanthos* (Sw.) Copel. (ホソバコケシノブ), *M. paniculiflorum* (Presl) Copel. (フジコケシノブ), *M. oligosorum* (Makino) H. Ito (キヨスミコケシノブ), *Hymenophyllum barbatum* (v. d. B.) Baker (コウヤコケシノブ), *Crepidomanes makinoi* (C. Chr.) Copel. var. *tosae* (Christ) K. Iwats. (アオホラゴケ), *Conocormus minutus* (Bl.) v. d. B. (ウチワゴケ), *Vandenboschia radicans* (Sw.) Copel. (ハイホラゴケ)

Pteridaceae *Dennstaedtia scabra* (Wall.) Moore (コバノイシカグマ), *D. scabra* (Wall.) Moore f. *glabrescens* (Ching) Tagawa (ウスゲコバノイシカグマ)^{**}, *D. hirsuta* (Sw.) Mett. (イヌシダ), *D. wilfordii* (Moore) Christ (オウレンシダ), *Microlepia marginata* (Panzer) C. Chr. (フモトシダ), *M. marginata* (Panzer) C. Chr. var. *yakusimensis* H. Ito (ケブカフモトシダ), *M. marginata* (Panzer) C. Chr. var. *bipinnata* Makino (クシャクフモトシダ), *Monachosorum flagellare* (Maxim.) Hayata (オオフジシダ), *Ptilopteris maximowiczii* (Bak.) Hance (フジシダ), *Sphenomeris chusana* (L.) Copel. (ホラシノブ), *Hypolepis punctata* (Thunb.) Mett. (イワヒメワラビ), *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn var. *latiusculum* (Desv.) Und. (ワラビ), *Pteris cretica* L. (オオバノイノモトソウ), *P. multifida* Poir. (イノモトソウ), *P. dispar* Kunze (アマクサシダ), *P. inaequalis* Bak. var. *aequata* (Miq.) Tagawa (オオバノハチジョウシダ), *P. inaequalit* Bak. var. *simplicior* Tagawa (オオバノアマクサンダ), *Coniogramme intermedia* Hieron. (イワガネゼンマイ), *C. intermedia* Hieron. f. *nosei* Kurata (チチブイワガネ)^{**}, *C. japonica* (Thunb.) Diels (イワガネソウ), *Ony-*

** 倉田悟博士の御教示による (1967)

chium japonicum (Thunb.) Kunze (タチシノブ), *Pleurosoriopsis makinoi* (Maxim.) Fomin(カラクサシダ), *Adiantum monochlamys* Eaton (ハコネシダ), *A. pedatum* L. (クジャクシダ)

Parkeriaceae *Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn. (ミズワラビ)

Davalliaceae *Davallia mariesii* Moore (シノブ)

Plagiogyriaceae *Plagiogyria japonica* Nakai (キジノオシダ), *P. euphlebia* (Kunze) Mett. (オオキジノオ), *P. matsumureana* Makino (ヤマソテツ)

Asplidiaceae *Matteuccia struthiopteris* (L.) Todaro (クサソテツ), *M. orientalis* (Hook.) Trev. (イヌガンソク), *Onoclea sensibilis* L. var. *interrupta* Maxim. (コウヤワラビ), *Woodsia polystichoides* Eaton (イワデンダ), *W. manchuriensis* Hook. (フクロシダ), *Polystichum craspedosorum* (Maxim.) Diels (ツルデンド), *P. tripteron* (Kunze) Pr. (ジュウモンジシダ), *P. tsus-simense* (Hook.) J. Sm. (ヒメカナワラビ), *P. makinoi* Tagawa (カタイノデ), *P. pseudo-makinoi* Tagawa (サイゴクイノデ), *Polystichum × namegatae* Kurata (ミツイシイノデ)^{**}, *P. tagawanum* Kurata (イノデモドキ), *P. retroso-paleaceum* (Kodama) Tagawa (サカゲイノデ), *P. retroso-paleaceum* (Kodama) Tagawa var. *ovato-paleaceum* (Kodama) Tagawa (ツヤナシイノデ), *P. polyblepharum* (Roem.) Pr. (イノデ), *P. polyblepharum* (Roem.) Pr. var. *intermedium* (Tag.) Kurata (アイアスカイノデ), *P. microchlamys* (Christ) Matsum. (カラクサイノデ), *Cyrtomium fortunei* J. Sm. (ヤブソテツ), *C. fortunei* J. Sm. var. *intermedium* Tagawa (ミヤコヤブソテツ), *C. fortunei* J. Sm. var. *clivicola* (Makino) Tagawa (ヤマヤブソテツ), *C. macrophyllum* (Makino) Tagawa (ヒロハヤブソテツ), *C. caryotideum* (Wall.) Pr. (メヤブソテツ), *Polystichopsis aristata* (Forst.) Holtt. (ホソバカナワラビ), *P. simplicior* (Makino) Tagawa. (ハカタシダ), *P. simplicior* (Makino) Tagawa var. *major* (Tagawa) Tagawa (オニカナワラビ), *P. amabilis* (Bl.) Tagawa (オオカナワラビ), *P. mutica* (Fr. et Sav.) Tagawa (シノブカグマ), *P. standishii* (Moore) Tagawa (リョウメンシダ), *P. maximowiczii* (Bak.) Tagawa (ナンタイシダ), *P. miqueliania* (Maxim.) Tagawa (ナライシダ), *Dryopteris atrata* (Wall.) Ching (イワヘゴ), *D. dickinsii* (Fr. et Sav.) C. Chr. (オオクジャクシダ), *D. tokyoensis* (Matsum.) C. Chr. (タニヘゴ), *D. monticola* (Makino) C. Chr. (ミヤマベニシダ), *D. kominatoensis* Tagawa (タニヘゴモドキ), *D. polylepis* (Fr. et Sav) C. Chr. (ミヤマクマワラビ), *D. crassirhizoma* Nakai (オシダ), *D. uniformis* (Makino) Makino (オクマワラビ), *D. lacera* (Thunb.) O. Ktze. (クマワラビ), *D. lacera* (Thunb.) O. Ktze. f. *dentata* (Koidz.) H. Ito (キレコミクマワラビ), *D. lacera* (Thunb.) O. Ktze. f. *intermedia* H. Ito (アイノコクマワラビ), *D. sabaei* (Fr. et Sav.) C. Chr. (ミヤマイタチシダ), *D. austriaca* (Jacq.) Woynar (シラネワラビ), *D. chinensis* (Bak.) Koidz. (ミサキカグマ), *D. pacifica* (Nakai) Tagawa (オオイタチシダ), *D. bissetiana* (Bak.) C. Chr. (ヤマイタチシダ), *D. saxifraga* H. Ito (イワイタチシダ), *D. sacrosancta* Koidz (ヒメイタチシダ), *D. fuscipes* C. Chr. (マルバベニシダ), *D. nippensis* Koidz. (トウゴクシダ), *D. erythrosora* (EAT.) O. Ktdze. (ベニシダ), *D. erythrosora* (EAT.) O. Ktze. form. *subdeltoidea* (Nakai.) H. Ito (ミドリベニシダ), *D. championii* (Benth.) C. Chr. (サイコクベニシダ), *D. kinkiensis* Koidz. (ギフベニシダ), *D. hondoensis* Koidz. (オオベニシダ), *D. indusiata* (Makino) Makino et Yamam. (ヌカイタチシダモドキ), *D. indusiata* (Makino) Makino et Yamam. var. *simasakii* H. Ito (ヌカイタチシダマガイ), *D. gymnosora* (Makino) C. Chr. (ヌカイタチシダ), *Ctenitis maximowicziana* (Miq.) Ching (キヨスマヒメワラビ), *Phegopteris bukoensis* (Tagawa) Tagawa (タチヒメ

ワラビ), *P. decursive-pinnata* (van Hall) Féé (ゲジゲジシダ), *P. polyodiooides* Féé (ミヤマワラビ), *Lastrea glanduligera* (Kunze) Moore (ハシゴシダ), *L. miquelana* Tagawa (コハシゴシダ), *L. nipponica* (Fr. et Sav.) Copel. (ニッコウシダ), *L. japonica* (Bak.) Copel. (ハリガネワラビ), *L. japonica* (Bak.) Copel. var. *mussiensis* Hiyama (イワハリガネワラビ)^{**}, *L. thelypteris* (L.) Bory (ヒメシダ), *L. subochthodes* (Ching) Tagawa (イブキシダ), *L. quelpaertensis* (Christ) Copel. (オオバショリマ), *L. laxa* (Fr. et Sav.) Copel. (ヤワラシダ), *L. oligophlebia* (Bak.) Copel. var. *elegans* (Koidz.) Tagawa (ヒメワラビ), *L. viridifrons* (Tagawa) Tagawa (ミドリヒメワラビ), *Leptogramma mollissima* (Fisch.) Ching (ミヅシダ), *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman (ウサギシダ), *G. oyamense* (Bak.) Ching (エビラシダ), *Cyclosorus acuminatus* (Houtt.) Nakai (ホシダ), *Acystopteris japonica* (Luerss.) Nakai (ウスヒメワラビ), *Athyrium brevifrons* Nakai (エゾメシダ), *A. melanolepis* (Fr. et Sav.) Christ (ミヤマメシダ), *A. deltoidefrons* Makino (サトメシダ), *A. multifidum* Ros. (オオサトメシダ), *A. pinetorum* Tagawa (タカネサトメシダ), *A. alpestre* (Hoppe) Rylands (オクヤマワラビ), *A. rupestre* Kodama (ミヤマヘビノネゴザ), *A. spinulosum* (Maxim.) Milde (ミヤマイヌワラビ), *A. yokoscense* (Fr. et Sav.) Christ (ヘビノネゴザ), *A. vidalii* (Fr. et Say.) Nakai (ヤマイヌワラビ), *A. clivicola* Tagawa (カラクサイヌワラビ), *A. wardii* (Hook.) Makino (ヒロハイヌワラビ), *A. niponicum* (Mett.) Hance (イヌワラビ), *A. niponicum* (Mett.) Hance. f. *metallicum* (Makino) Honda (ニシキシダ), *A. otophorum* (Miq.) Koidz. (タニイヌワラビ), *A. sheareri* (Bak.) Ching (ウラボシノコギリシダ), *A. iseaneum* Ros (ホソバイヌワラビ), *A. frangulum* Tagawa (ミヤコイヌワラビ), *A. mesosorum* (Makino) Makino (ヌリワラビ), *A. atkinsonii* Bedd. (テバコワラビ), *A. crenatum* (Sommerf.) Rupr. var. *glabrum* Tagawa (ミヤマシダ), *A. squamigerum* (Mett.) Ohwi (キヨタキシダ), *A. japonicum* (Thunb.) Copel. (シケシダ), *A. coniliifera* (Fr. et Sav.) Tagawa (ホソバシケシダ), *A. pyconosorum* Christ (ミヤマシケシダ), *A. viridifrons* Makino (ミドリワラビ), *A. unifurcatum* (Bak.) C. Chr. (オオヒメワラビモドキ), *A. okuboanum* Makino (オオヒメワラビ), *Cornopteris decurrenti-alata* (Hook.) Nakai (シケチシダ), *C. hakonensis* (Makino) Nakai (ハコネシケチシダ)^{**}, *C. crenulatoserrulata* (Makino) Nakai (イッポンワラビ), *Diplazium subsinuatum* (Wall.) Tagawa (ヘラシダ), *D. wichurae* (Mett.) Diels (ノコギリシダ), *D. mettenianum* (Miq.) C. Chr. (ミヤマノコギリシダ), *D. mettenianum* (Miq.) C. Chr. var. *tenuifolium* Kurata (ウスバミヤマノコギリシダ)^{**}, *D. okudairae* Makino (イヨクジャク), *D. hachijoense* Nakai (シロヤマンダ), *D. nipponicum* Tagawa (オニヒカゲワラビ), *D. bittyuense* Tagawa (ビッチュウヒカゲワラビ), *D. chinense* (Bak.) C. Chr. (ヒカゲワラビ)^{**}, *Diplaziopsis cavaleriana* (Christ) C. Chr. (イワヤシダ)

Blechnaceae *Struthiopteris castanea* (Makino) Nakai (ミヤマシシガシラ), *S. amabilis* (Makino) Ching (オサシダ), *S. niponica* (Kunze) Nakai (シシガシラ), *Woodwardia orientalis* Sw. (コモチシダ)

Aspleniaceae *Asplenium normale* Don (ヌリトラノオ), *A. normale* Don var. *boreale* Ohwi, (シモツケヌリトラノオ), *A. oligophlebium* Bak. (カミガモシダ), *A. tripteropus* Nakai (イヌチャセンシダ), *A. trichomanes* L. (チャセンシダ), *A. incisum* Thunb. (トラノオシダ), *A. wrightii* Eat. (クルマシダ), *A. planicaule* Wall. var. *yoshinagae* (Makino) Tagawa (トキワシダ), *A. wilfordii* Mett. (アオガネシダ), *A. pseudo-wilfordii* Tagawa (オクタマシダ), *A. sarelii* Hook. (コバノヒノキシダ), *A. pekinense* Hance

(トキワトラノオ), *A. varians* Wall. (イワトラノオ), *A. capillipes* Makano (ヒメイワトラノオ), *A. ruta-muraria* L. (イチョウシダ), *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. (コタニワタリ), *Camptosorus sibiricus* Rupr. (クモノスシダ)

Polypodiaceae *Polypodium fauriei* Christ (オシャグジデンダ), *P. niponicum* Mett. (アオネカズラ), *Lepisorus uchiyamae* (Makino) H. Ito (コウラボシ), *L. annuifrons* (Makino) Ching (ホテイシダ), *L. ussuriensis* (Reg.) Ching var. *distans* (Makino) Tagawa (ミヤマノキシノブ), *L. onoei* (Fr. et Sav.) Ching (ヒメノキシノブ), *L. thunbergianus* (Kaulf.) Ching (ノキシノブ), *Drymotaenium miyoshianum* (Makino) Makino (クラガリシダ), *Lemmaphyllum microphyllum* Pr. (マメヅタ), *Neocheiropteris ensata* (Thunb.) Ching (クリハラン), *N. subhastata* (Bak.) Tagawa (ヤノネシダ), *Pyrrosia linearifolia* (Hook.) Ching (ビロウドシダ), *P. lingua* (Thunb.) Farwell (ヒツバ), *P. tricuspidata* (Sw.) Tagawa (イワオモダカ), *Crypsinus hastatus* (Thunb.) Copel. (ミツデウラボシ), *C. veitchii* (Bak.) Copel. (ミヤマウラボシ), *Loxogramme saziran* Tagawa (サジラン), *L. salicifolia* Makino (イワヤナギシダ), *L. grammitoides* (Bak.) C. Chr. (ヒメサジラン),

Grammitidaceae *Xiphopteris okuboi* (Yatabe) Copel. (オオクボシダ)

Vittariaceae *Antrophyum obovatum* Bak. (タキミシダ), *Vittaria fudzinoi* Makino (ナカミシシラン), *V. flexuosa* Fée (シシラン)

Marsileaceae *Marsilea quadrifolia* L. (デンジソウ)

Salviniaceae *Salvinia natans* (L.) All. (サンショウモ)

Azollaceae *Azolla imbricata* (Roxb.) Nakai (アカウキクサ), *A. japonica* Fr. et Sav. (オオアカウキクサ)

本資料を作製するにあたり、御協力された本学植物研究部、寒原悦子、堀佳代子の両嬢に感謝する。




Fig. 1 A, B and C. : *Dryopteris kinkiensis* Koidz. ギフベニシダ (Aspidiaceae)
D : Map of distribution







Fig. 2 E : *Lycopodium cernuum* L. ミズスギ (Lycopodiaceae)
 F : *Ctenitis maximowicziana* Ching. キヨスミヒメワラビ (Aspleniaceae)
 G : *Athyrium shearerii* Ching. ウラボシノコギリシダ (Aspleniaceae)
 H : Map of distribution (● : E, ▲ : F, × : G)




Fig. 3 I : *Dryopteris kominatoensis* Tagawa, タニヘゴモドキ (Aspidiaceae)
J : *Gymnocarpium oyamense* Christ, エビラシダ (Aspidiaceae)
K : *Asplenium wrightii* Eat. クルマシダ (Aspleniaceae)
L : Map of distribution (● : I, ▲ : J, X : K)




Fig. 4 M : *Asplenium tripteropus* Nakai イヌチヤセンシダ (Aspleniaceae)

N : *A. oligophlebium* Bak. カミガモシダ (Aspleniaceae)

O : *A. normale* Don var. *boreale* Ohwi et Kurata シモツケヌリトラノオ (Aspleniaceae)

P : Map of distribution (● : M, ▲ : N, × : O)




Fig. 5 Q : *Pyrrosia lingua* Farwell ヒツバ (Polypodiaceae)

R : *Neocheiropteris subhastata* Tagawa ヤノネシダ (Polypodiaceae)

S : *Drymotaenium miyoshianum* Makino クラガリシダ (Polypodiadeae)

T : Map of distribution (● : Q, ▲ : R, × : S)





Fig. 6 U : *Loxogramme saziran* Tagawa サジラン (Polypodiaceae)
 V : *Polypodium niponicum* Mett. アオネカズラ (Polypodiaceae)
 W : *Xiphopteris okuboi* Copel オオクボシダ (Grammitidaceae)
 X : Map of distribution (● : U, ▲ : V, × : W)

	地名	シダ種類数
A	郡上郡	141
B	神崎川	131
C	揖斐郡	174
D	伊吹山	111
E	金華山	112
F	養老	78
G	能郷白山	64
H	板取川	76
I	加子母村	77
J	位山	39
K	白山	61
L	天生峠	23



th : higher temperature Precipitation / year

tl : lower temperature

pm : more precipitation —— Average temperature

pl : less precipitation

Fig. 7 Map of the distribution of ferns, Precipitation / year and Average temperature.