

資 料

水野瑞夫・田中俊弘・鈴木祥之：岐阜薬科大学腊葉目録 (8)

(植物分布地理研究)

三重県安芸郡芸濃町植物目録

Mizuo Mizuno, Toshihiro Tanaka, Shōshi Suzuki: List on the herbarium
of Gifu College of Pharmacy (8)

List of the plants in GEINŌ-CHŌ, AGE-GUN, Pref. MIE

Lycopodiaceae

<i>Lycopodium serratum</i> Thunb.	トウケシバ
<i>L. serratum</i> Thunb. var. <i>serratum</i>	ホソバトウケシバ
<i>L. clavatum</i> L. var. <i>nipponicum</i> Nakai	ヒカゲノカズラ
<i>L. obscurum</i> L. f. <i>obscurum</i>	ウチワマンネンスギ
<i>L. cernuum</i> L.	ミズスギ

Selaginellaceae

<i>Selaginella involvens</i> (Sw.) Spring	カタヒバ
---	------

Equisetaceae

<i>Equisetum arvense</i> L.	スギナ
-----------------------------	-----

Botrychiaceae

<i>Sceptridium japonicum</i> (Plantle) Lyon	オオハナワラビ
---	---------

Osmundaceae

<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	ゼンマイ
--------------------------------	------

Schizaeaceae

<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	カニクサ
--	------

Gleicheniaceae

<i>Gleichenia japonica</i> Spr.	ウラヅロ
---------------------------------	------

Pteridaceae

<i>Denstaedtia wilfordii</i> (Moore) Christ	イヌシダ
<i>Microlepia marginata</i> (Panzer) C. Chr.	フモトシダ
<i>Sphenomeris chusana</i> (L.) Copel.	ホラシノブ
<i>Pteris cretica</i> L.	オオバノイノモトソウ
<i>P. multifida</i> Poir.	イノモトソウ
<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels	イワガネソウ
<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	タチシノブ
<i>Adiantum pedatum</i> L.	クジャクシダ

Plagiogyriaceae

<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	オオキジノオ
--	--------

Aspidiaceae

<i>Matteuccia orientalis</i> Trev.	イヌガンソク
------------------------------------	--------

<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton	イワデンダ
<i>Polystichum pseudo-makinoi</i> Tagawa	サイゴクイノデ
<i>P. tagawanum</i> Kurata	イノデモドキ
<i>P. polyblepharum</i> (Roem.) Pr.	イノデ
<i>Cyrtomium macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	ヤブソテツ
<i>C. fortunei</i> J. Sm.	ヒロハヤブソテツ
<i>Polystichopsis mutica</i> (Fr. et Sav.) Tagawa	リョウメンシダ
<i>Dryopteris lacera</i> (Thunb.) C. Ktze.	クマワラビ
<i>D. pacifica</i> Tagawa	オオイタチシダ
<i>D. bissetiana</i> (Bak.) C. Chr.	ヤマイタチシダ
<i>D. sacrosancta</i> Koidz.	ヒメイタチシダ
<i>D. championii</i> (Benth.) C. Chr.	サイゴクベニシダ
<i>D. kinkiensis</i> Koidz.	ギフベニシダ
<i>D. hondoensis</i> Koidz.	オオベニシダ
<i>Phegopteris decursive-pinnata</i> (vdn Jall) Fee	ゲジゲジシダ
<i>Lastrea miqueliana</i> Tagawa	コハシゴシダ
<i>L. oligophlebis</i> Copel. var. <i>elegans</i> Tagawa	ヒメワラビ
<i>Athyrium niponicum</i> Hance	イヌワラビ
<i>A. japonicum</i> Copel.	シケシダ
<i>Diplazium subsinuatum</i> Tagawa	ヘラシダ
Blechnaceae	
<i>Struthiopteris niponica</i> (Kunze) Nakai	シシガシラ
<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	コモチシダ
Aspleniaceae	
<i>Asplenium trichomanes</i> L.	チャセンシダ
<i>A. incisum</i> Thunb.	トラノオシダ
Polypodiaceae	
<i>Lepisorus thunbergianus</i> Ching	ノキシノブ
<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Pr.	マメヅタ
<i>Crysinus hastatus</i> (Thunb.) Copel.	ミツデウラボシ
Pinaceae	
<i>Pinus densiflora</i> Sieb. et Zucc.	アカマツ
Taxodiaceae	
<i>Cryptomeria japonica</i> D. Don	スギ
Cupressaceae	
<i>Chamaecyparis obtusa</i> Endl.	ヒノキ
<i>Juniperus rigida</i> Sieb. et Zucc.	ネズ
<i>J. conferta</i> Parl.	ハイネズ
<i>Biota orientalis</i> Endl.	コノテガシワ
Cephalotaxaceae	
<i>Cephalotaxus harringtonia</i> K. Koch	イヌガヤ
Salicaceae	
<i>Salix bakko</i> Kimura	バッコヤナギ

Fagaceae

<i>Quercus glauca</i> Thunb.	アラカシ
<i>Q. serrata</i> Thunb.	コナラ
<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky	ツブラジイ
<i>C. cuspidata</i> Schottky subsp. <i>cuspidata</i>	イタジイ

Moraceae

<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zuss.	カナムグラ
<i>Ficus niponica</i> Fr. et Rav.	イタビカズラ
<i>F. stipulata</i> Thunb.	ヒメイタビ

Urticaceae

<i>Nanocnide japonica</i> Blume	カテンソウ
<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud. subsp. <i>nivea</i>	カラムシ

Loranthaceae

<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engler	ヒノキバヤドリギ
--	----------

Polygonaceae

<i>Rumex acetosa</i> L.	スイバ
<i>Polygonum persicaria</i> L.	ハルタデ
<i>P. debile</i> Meisn.	ミヤマタニソバ
<i>P. cuspidatum</i> Sieb. et Zucc.	イタドリ

Amaranthaceae

<i>Achyranthes fauriei</i> Lev. et Van.	ヒナタノイノコヅチ
---	-----------

Caryophyllaceae

<i>Cerastium caespitosum</i> Gilib. var. <i>ianthes</i> (Williams) Hara	ミミナグサ
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	ミドリハコベ
<i>S. alsine</i> Grimm var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	ノミノフスマ

Ranunculaceae

<i>Cimicifuga japonica</i> (Thunb.) Sprengel	イヌシヨウマ
<i>Clematis apiifolia</i> DC.	ボタンズル
<i>C. terniflora</i> DC.	センニソソウ
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L. var. <i>intermedium</i> Nakai	カラマツソウ
<i>Ranunculus quelpaertensis</i> Nakai	キツネノボタン

Lardizabalaceae

<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	ミツバアケビ
--	--------

Magnoliaceae

<i>Kadsura japonica</i> (Thunb.) Dunal	サネカズラ
--	-------

Lauraceae

<i>Cinnamomum camphora</i> Sieb.	クスノキ
<i>Lindera umbellata</i> Thunb.	クロモジ
<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	タブノキ
<i>M. japonica</i> Sieb. et Zucc.	ホソバタブ
<i>Neolitsea aciculata</i> (Blume) Koidz.	イヌガシ

Saururaceae

<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	ドクダミ
----------------------------------	------

Aristolochiaceae

Asarum kooyanum Makino var. *brachypodion* (F. Maek.) Kitam. スズカカンアオイ

Theaceae

amellia japonica L. ヤブツバキ

Eurya japonica Thunb. ヒサカキ

Guttiferae

Sarothra laxa (Blume) Y. Kimura コケオトギリ

Hypericum erectum Thunb. オトギリソウ

Droseraceae

Drosera roturdifolia L. モウセンゴケ

D. peltata Smith var. *nipponica* (Masam.) Ohwi イシモチソウ

Papaveraceae

Corydalis incisa (Thunb.) Pers. ムラサキケマン

C. heterocarpa Sieb. et Zucc. var. *japonica* (Fr. et Sav.) Ohwi キケマン

Macleya cordata (Willd.) R. Br. タケニグサ

Chelidonium majus L. subsp. *asiaticum* Hara クサノオウ

Cruciferae

Cardamine flexuosa With. タネツケバナ

C. scutata Thunb. オオバタネツケバナ

Crassulaceae

Sedum subtile Miq. ヒメレンゲ

Saxifragaceae

Chrysosplenium grayanum Maxim. ネコノメソウ

C. album Maxim. var. *stamineum* (Franch.) Hara ハナネコノメ

Mitella stylosa Boiss. チャルメルソウ

Hydrangea hirta (Thunb.) Sieb. コアジサイ

Deutzia crenata Sieb. et Zucc. ウツギ

Astilbe thunbergii (Sieb. et Zucc.) Miq. アカショウマ

Rosaceae

Agrimonia pilosa Ledeb. キンミズヒキ

Sanguisorba officinalis L. ワレモコウ

Geum japonicum Thunb. ダイコンソウ

Potentilla kleiniana Wight et Arn. オヘビイチゴ

Rubus buergeri Miq. フユイチゴ

R. palmatus Thunb. ナガバモミジイチゴ

R. parvifolius L. ナワシロイチゴ

Rosa multiflora Thunb. ノイバラ

Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne var. *laevis* (Thunb.) Stapf ウシコロシ

Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel. コゴメウツギ

Potentilla chinensis Ser. カワラサイコ

P. freyniana Bornm. ミツバツチグリ

Photinia glabra Maxim. アカメモチ

Leguminosae

Cassia nomame (Sieb.) Honda カワラケツメイ

<i>Kummerovia striata</i> Schindler	ヤハズソウ
<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Sieb. at Zucc.	ネコハギ
<i>L. cyrtobotrya</i> Miq.	マルバハギ
<i>L. bicolor</i> Turcz. var. <i>japonica</i> Nakai	ヤマハギ
<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	ミヤコグサ
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>angustifolia</i> (L.) Gaudinvar. <i>segetalis</i> (Thuill) Ser.	ヤハズエンドウ
<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	カスマグサ
<i>V. hirsuta</i> (L.) S. F. Gray	スズメノエンドウ
<i>Pueraria lobata</i> Ohwi	クズ
<i>Wisteria brachybotrys</i> Sieb. et Zucc.	ヤマフジ
<i>Albizzia julibrissin</i> Durazz.	ネムノキ
Oxalidaceae	
<i>Oxalis corniculata</i> L.	カタバミ
<i>O. acetosella</i> L. subsp. <i>griffithii</i> Hara	ミヤマカタバミ
Rutaceae	
<i>Boenninghausenia albiflora</i> (Hook.) Reich. var. <i>japonica</i> (Sieb.) S. Suzuki	マツカゼソウ
<i>Zanthoxylum piperitum</i> DC.	サンショウ
<i>Z. planispinum</i> Sieb. et Zucc.	フユザンショウ
<i>Skimmia japonica</i> Thunb.	ミヤマシキミ
Buxaceae	
<i>Buxus microphylla</i> Sieb. et Zucc. var. <i>japonica</i> Rehd. et Wils.	ツゲ
Polygalaceae	
<i>Polygala japonica</i> Houtt.	ヒメハギ
Anacardiaceae	
<i>Rhus iavanica</i> Mill.	スルデ
<i>Vaccinium oldhami</i> Miq.	ナツハゼ
Aquifoliaceae	
<i>Ilex crenata</i> Thunb.	イヌツゲ
<i>I. integra</i> Thunb.	モチノキ
<i>I. pedunculosa</i> Miq.	ソヨゴ
Vitaceae	
<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> Trautv. var. <i>beterophylla</i> Hara.	ノブドウ
<i>Parthenocissus tricuspidata</i> Planch.	ツタ
<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn.	ヤブガラシ
<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	サンカクズル
Elaeagnaceae	
<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	ツルグミ
<i>E. pungens</i> Thunb.	ナワシログミ
Violaceae	
<i>Viola kusanoana</i> Makino	オオタチツボスミレ
<i>V. obtusa</i> (Makino) Makino	ニオイツボスミレ
<i>V. patrini</i> DC.	シロバナスミレ
<i>V. mandshurica</i> W. Becker	スミレ

<i>V. pumilio</i> W. Becker	フモトスミレ
Stachyuraceae	
<i>Stachyurus paecox</i> Sieb. et Zucc.	キブシ
Lythraceae	
<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	ミソハギ
Onagraceae	
<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbas	オオマツヨイグサ
Haloragaceae	
<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R. Br.	アリノトウグサ
Cornaceae	
<i>Aucuba japonica</i> Thunb.	アオキ
<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F. G. Dietr.	ハナイカダ
Aceraceae	
<i>Acer crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.	ウリカエデ
<i>A. palmatum</i> Thunb.	イロハカエデ
Araliaceae	
<i>Acanthopanax spinosus</i> Miquel	ヤマウコギ
<i>Aralia elata</i> Seem.	タラノキ
<i>Hedera rhombea</i> Sieb. et Zucc.	キツタ
<i>Dendropanax trifidus</i> Makino	カクレミノ
Umbelliferae	
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban	ツボクサ
<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	ウマノミツバ
<i>Anthriscus sylvestris</i> Hoffm. subsp. <i>aemula</i> Kitam. et Murata	コシヤク
<i>Cryptotaenia canadensis</i> DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand. Mzt.	ミツバ
<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Makino et Yabe	ヤブニンジン
<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino	セントウソウ
<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	セリ
Diapensiaceae	
<i>Shortia soldanelloides</i> (Sieb. et Zucc.) Makino var. <i>ilicifolia</i> (Maxin.) Makino	イワカガミ
Pyrolaceae	
<i>Pyrola japonica</i> Klenzex	イチヤクソウ
Ericaceae	
<i>Pieris japonica</i> D. Don	アセビ
<i>Rhododendron dilatatum</i> Miq.	ミツバツツジ
<i>R. kaemmpferi</i> Planch.	ヤマツツジ
<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	シャシャンボ
<i>V. versicolor</i> Nakai	スノキ
Myrsinaceae	
<i>Ardisia japonica</i> Bl.	ヤブコウジ
Primulaceae	
<i>Lysimachia japonica</i> Thunb. f. <i>subsessilis</i> (F. Maekawa) Murata	コナスビ

<i>L. fortunei</i> Maxim.	ヌマトラノオ
Styracaceae	
<i>Styrax japonicus</i> Sieb. et Zucc.	エゴノキ
Oleaceae	
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ネズミモチ
<i>L. obtusifolium</i> Sieb. et Zucc.	イボタノキ
Gentianaceae	
<i>Tripterospermum japonicum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	ツルリンドウ
<i>Gentiana thunbergii</i> (G. Don) Griseb.	ハルリンドウ
<i>G. scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim.	リンドウ
Apocynaceae	
<i>Trachospermum asiaticum</i> Nakai var. <i>intermedium</i> Nakai	テイカカズラ
Convolvulaceae	
<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	マメダオシ
Boraginaceae	
<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth.	キュウリグサ
<i>Omphalodes japonica</i> (Thunb.) Maxim.	ヤマルリソウ
Verbenaceae	
<i>Chlerodendron trichotomum</i> Thunb.	クサギ
Labiatae	
<i>Perillula reptans</i> Maxim.	スズコウジュ
<i>Salvia japonica</i> Thunb.	アキノタムラソウ
<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A. Gray) Hara	カキドウシ
<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) Hara	ウツボグサ
<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	キラソウ
<i>A. nipponensis</i> Makino	ジュウニヒトエ
Scrophulariaceae	
<i>Veronica persica</i> Poir.	オオイヌノフグリ
<i>Melampyrum ciliare</i> Miq.	ママコナ
<i>Lindernia pyxidaria</i> L.	アゼナ
Gesneriaceae	
<i>Conandron ramondioides</i> Sieb. et Zucc.	イワタバコ
Phrymaceae	
<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Hara) Kitam.	ハエドクソウ
Plantaginaceae	
<i>Plantago asiatica</i> L.	オオバコ
Rubiaceae	
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. var. <i>mairai</i> (Lev.) Hara	ヘクソカズラ
<i>Rubia cordifolia</i> L. var. <i>munjista</i> Miq.	アカネ
<i>Galium verum</i> L. var. <i>asiaticum</i> Nakai f. <i>nikkoense</i> (Nakai) Ohwi	カワラマツバ
<i>G. trifidum</i> L. var. <i>brevipedunculatum</i> Regel.	ホソバノヨシバムグラ
<i>Mitchella undulata</i> Sieb. et Zucc.	ツルアリドウシ
<i>Damnaeanthus indicus</i> Gaertn.	アリドウシ

Caprifoliaceae

<i>Abelia spathulata</i> Sieb. et Zucc.	ツクバネウツギ
<i>Lonicera caerulea</i> L. var. <i>emphylocalyx</i> Nakai	ウゲイスカズラ
<i>L. japonica</i> Thunb.	スイカズラ
<i>Sambucus sieboldiana</i> Bl.	ニワトコ
<i>Viburnum dilstatum</i> Thunb.	ガマネズミ

Valerianaceae

<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	ツルカノコソウ
---------------------------------------	---------

Campanulaceae

<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A. DC. subsp. <i>aperticampamlata</i> Kitam.	ツリガネニンジン
---	----------

Compositae

<i>Ixeris dentata</i> (Thunb.) Nakai	ニガナ
<i>I. debilis</i> A. Gray	オオヂシバリ
<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> Krylv.	コウゾリナ
<i>Taraxacum platycarpum</i> Dahlstedt	カントウタンポポ
<i>Lapsana humilis</i> (Thunb.) Makino	ヤブタバコ
<i>L. apogonoides</i> Maxim.	コオニタバコ
<i>Pertya scandens</i> (Thunb.) Sch. -Bip.	コウヤボウキ
<i>P. glabrescens</i> Seh. -Bip.	ナガバノコウヤボウキ
<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	センボンヤリ
<i>Cirsium japonicum</i> DC.	ノアザミ
<i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairv. subsp. <i>fauriei</i> (Lev. et Vant.) Kitam.	オカオグルマ
<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	ヤブレガサ
<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	オトコヨモギ
<i>A. princeps</i> Pamp.	ヨモギ
<i>Chrysanthemum makinoi</i> Matsum. et Nakai	リュウノウギク
<i>Adenocaulon himalaicum</i> Edgew.	ノブキ
<i>Petasites japonicus</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim.	フキ
<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	サジガンクビソウ
<i>Gnaphalium affine</i> D. Don.	ハハコグサ
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	ヒメジョオン
<i>E. sumatrensis</i> Retz.	オオアレチノギク
<i>Kalimeris yomena</i> Kitam.	ヨメナ

Liliaceae

<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franchet	ソクシンラン
<i>Smilax nipponica</i> Miquel	タチシオデ
<i>S. biflora</i> var. <i>trinervula</i> (Miquel) Hatusima	サルマメ
<i>Liriope platyphylla</i> Wang et Tang.	ヤブラン
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L. f.) Ker-Gawler.	ジャノヒゲ
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	オモト
<i>Disporum smilacinum</i> A. Gray	チゴユリ
<i>Lilium leichtlinii</i> Hooker var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker	コオニユリ
<i>Hosta longipes</i> (Fr. et Sav.) Matsumura	イワギボウシ

<i>Tricyrtis hirta</i> (Thunb.) Hooker	ホトトギス
<i>Heloniopsis orientalis</i> (Thunb.) C. Tanaka	ショウジョウバカマ
<i>Metanarthecium luleo-viride</i> Maxim.	ノギラン
<i>Tofieldia nuda</i> Maxim.	イワゼキショウ
Dioscoreaceae	
<i>Dioscorea japonica</i> Thunberg	ヤマノイモ
<i>D. tokoro</i> Makino	オニドコロ
<i>D. quinqueloba</i> Thunberg	カエデドコロ
Iridaceae	
<i>Iris japonica</i> Thunb.	シャガ
Juncaceae	
<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq	スズメノヤリ
Pontederiaceae	
<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm. f.) Presl var. <i>plantaginea</i> (Roxb.) Solms Laub.	コナギ
Commelinaceae	
<i>Commelina communis</i> L.	ツユクサ
Gramineae	
<i>Pycreus globosus</i> Reichb.	アゼガヤツリ
<i>Poa annua</i> L.	スズメノカタビラ
<i>Isachne globosa</i> O. Kunze	チゴザサ
<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv. var. <i>minor</i> (Thunb.) Ohwi	エノコログサ
<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Arduino) Roemer et Schultes	チヂミザサ
Araceae	
<i>Arisaema japonicum</i> Blume	マムシゲサ
<i>A. yamatense</i> Nakai	ムロウテンナンショウ
Cyperaceae	
<i>Cyperus microiria</i> Steudel	カヤツリグサ
<i>Eleocharis wichurai</i> Bockeler	シカクイ
<i>Carex siderosticta</i> Hance.	タガネソウ
Zingiberaceae	
<i>Alpinia japonica</i> (Thunb.) Miq.	ハナミョウガ
Orchidaaceae	
<i>Tulotis ussuriensis</i> (Regel et Maack) Hara	トンボソウ
<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Reichb.	オオバノトンボソウ
<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Reichb.	ミヤマウズラ
<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	コ克蘭
<i>Bulbophyllum incospicuum</i> Maxim.	ムギラン
<i>Cymbidium virescens</i> Lindl.	シユンラン

越前、近江、美濃の境から発した伊吹山地は南下して伊吹山（1377m）で終る。更に関ヶ原の狭部を隔てて霊仙山（1084m）にはじまる鈴鹿山脈は近江、美濃の境から更に近江、伊勢の境を南下し、藤原岳（1143m）、御在所岳（1219m）を経て伊勢、伊賀の境の鈴鹿峠に至る。この附近で布引山脈がこれに取って代る。鈴鹿山脈の藤原岳より北の方は広く石灰岩が分布しているがそれより南は御在所岳、鎌ヶ岳のように花崗岩から成っている。布引

山地も片質花崗岩から成っている。芸濃町は布引山地の北端の任置にして、 $34^{\circ}52'N$, $136^{\circ}26'E$ で東西13,38km, 南北8,75kmである。総面積は64,19km²でその内約67%が山林原野で占められている。東部はほとんどが田畑に利用されているが西部はほとんどが山林原野で占められている。町内の河川の大多数は安濃川あるいはその支流に属する。年平均気温約15°C, 年降水量約1525mmである。年降水量が少ないため山麓には灌漑用溜池が造られている。特に横山池は有名である。

山地の頂上及び尾根筋にはコマユミ, アカメガシワ, ドウダンツツジ, イヌツゲ, リョウブ, コナラ, ダンコウバイ等の陽地性植物がみられる。山地のほとんどがスギ, ヒノキの人工林あるいは二次林から成りミズナラ, *Acer sp*等の落葉樹およびホソバタブ, イヌガシ, ヤブツバキ等の暖地性常緑広葉樹から成る。安濃川流域にはタブノキ, ゴマギ, イボタノキが特に多い。北部の石山観音附近にはツブラジイ, モチノキ, ソヨゴ, ヤマモミジ, ヤブツバキ等から成る社叢林の発達がみられる。その他にカクレミノ, イヌビワ, イタビカズラ, ヒメイタビ, コモチシダ, ミズスギ等の暖地性植物の自生も多い。しかし着生植物, 殊に着生シダ, コケシノブ類が少ないことは雨量が少く, 従って周囲の湿度が低いためと考えられる。芸濃町北部の忍田地区の湿地にはしばしば食虫植物のモウセンゴケ, イシモチソウがみられる。本目録作製に関し採集に協力された本学学生塩谷正, 目録作製に協力された堀佳代子両君に感謝いたします。採集に便宜を計り協力いただいた当町野間米吉氏(岐阜薬専第十四回卒)に感謝いたします。

